


EINSTEIN ZA POČETNIKE

[HTTP://WWW.ASTRONOMIJA.CO.YU](http://www.astronomija.co.yu)

$$E=mc^2$$



ALBERT EINSTEIN
(1879 - 1955)

EINSTEIN ZA POČETNIKE

[[HTTP://WWW.ASTRONOMIJA.CO.YU](http://www.astronomija.co.yu)]

S A D R Ž A J

1. UVOD	2.
2. RAZLIČITO SHVATANJE PROSTORA I VREMENA	4.
3. POČECI TEORIJE RELATIVNOSTI.....	7.
4. SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI	13.
5. OPŠTA TEORIJA RELATIVNOSTI.....	24.
6. OSNOVE KVANTNE TEORIJE.....	30.
7. NA GRANICI FIZIČKE REALNOSTI	33.
8. OBJEDINJENJE FIZIKE.....	36.
• BIOGRAFIJA	38.

1. UVOD

Od kada je nastao, čovjek posmatra nebo i čudi se onome što vidi. Ima li ikakvog smisla ili svrhe u pojavama koje se dešavaju na nebu ?

Do prije nekoliko vijekova ljudi su vjerovali da Zemlja miruje u centru vasione, a Sunce, Mjesec, zvijezde i planete, kruže oko nas, odajući tako svakodnevnu počast našem jedinstvenom centralnom položaju. Nikakvo čudo što su ljudi tada izmislili astrologiju, jer ako mi zauzimamo centralan položaj u vasioni onda izgled sasvim prirodno da zvijezde utiču na naše živote dok se okreću oko nas.

Osnovna lekcija koju je čovječanstvo naučilo u posljednjih 400 godina je da su ta drevna shvatanja bila totalno pogrešna. Zemlja ne zauzima posebno mesto u vasioni. Živimo na jednoj sasvim običnoj planeti, jednoj od devet koje kruže oko tipične zvijezde koju nazivamo Sunce. A ta zvijezda, naše Sunce, samo je jedna među milijardama drugih zvijezda rasutih po našoj galaksiji. Čak i cijela naša galaksija nije ništa naročito. Samo jedan pogled kroz najmoćnije teleskope otkriva milione sličnih galaksija rasutih beskonačnim dubinama vasione.

Savrijemena otkrića astronomije i fizike možda na neke ljude djeluju deprijesivno. Po njihovom mišljenju moderna astronomija nas uči da je čovječanstvo skup beznačajnih mikroba priljepljenih za malu stijenu koja kruži oko jedne sasvim obične zvijezde, negdje u jednoj galaksiji kakvih ima na milione u neshvatljivo ogromnoj vasioni.

Ipak, prednost treba dati drugačijem shvatanju. Tačno je to da smo mi samo jedna liliputanska rasa koja neizvjesno lebdi u biosferi koja okružuje jednu malu, plavu planetu. Ali mi, ta sićušna stvorenja, zahvaljujući svom ljudskom umu imamo neobičnu sposobnost da ispitujemo i shvatamo sudbinu vasione. Stvarna lekcija moderne astronomije nije da su naša tijela beznačajna, nego da je ljudski um moćan.

Do početka XX vijeka smisao prostora oko nas bio je potpuno nezavisan od pojma vremena. Obični ljudi, naučnici, svi, lako su se snalazili u ovom našem prostoru sastavljenom od tri pravca : naprijed-nazad, lijevo-desno i gore-dole, a vrijeme, vrijeme je teklo ravnomjerno, uvijek istim tempom i uvijek u istom smjeru, od prošlosti ka budućnosti. Ali, šta su uopšte to prostor i vrijeme !? Svi ljudi ove pojmove koriste svakog dana, ali rijetko ko se zapita šta oni zapravo predstavljaju, koje je njihovo pravo fizičko značenje.

Svima je dobro poznato da sve što se dešava dešava se negde u prostoru, i u nekom vremenskom trenutku. Kroz prostor se krećemo, on je postojao prije nas, i nastaviće da postoji poslije nas. Isto tako je i sa vremenom, vrijeme neprekidno teče, na istu stranu, istom brzinom.

Na prvi pogled djeluje da prostor i vrijeme nemaju mnogo toga zajedničkog, ali da li je stvarno tako ?

Do početka XX vijeka i smatralo se da je tako, ali tada je došlo do velike promjene u shvatanju ovih fundamentalnih pojmova prirode. Jedan od najvećih umova moderne fizike je sve to promenio, i u fiziku uveo jedan novi pojam koje je objedinio prostor i vrijeme. Taj nov pojam bio je prostor-vrijeme. Uvođenjem ovog novog pojma svijet oko nas prilično mijenja svoj izgled – on prestaje da bude trodimenzionalan i postaje četvorodimenzionalan. Istovremeno, pojavljuje se mnogo pitanja na koje treba dati odgovore : Da li se svijet sastoji samo od 4 dimenzije nama poznate dimenzije ili ih možda ima još više ? Postoji li mogućnost da putujemo unazad kroz vrijeme ? Itd ,itd. Ima još mnogo sličnih pitanja, ali teško je sa sigurnošću na njih odgovoriti.

1.1. ŠTA JE TO NAUČNA TEORIJA ?

Naučna teorija je samo jedan model. Ona je skup pravila koja povezuju kvalitet i kvantitet objekata iz modela sa posmatranjima koja se vrše u realnom svijetu, pa prema tome ako naš model predvidi da će se nešto dogoditi, ona možemo biti prilično sigurni da će se to stvarno dogoditi (naravno, ako je model tačan).

Ovakav model, odnosno teorija, tj. zakon, postoji samo u mislima naučnika i nigdje drugo. "Njutnovi zakoni" nisu zapisani u nekom univerzalnom priručniku, i ne postoji policija koja bi "jurila" one koji ne bi poštovali ove zakone.

Svaka teorija je na svom početku neka mala ideja proistekla iz nekih zaključaka koje na izgled odgovaraju pravom stanju stvari u prirodi, ali ona nije dovoljno provjerena niti je o njoj "razmišljao" dovoljan broj ljudi, ili jednostavno nije poznato kako ona može da se provjeri u stvarnom svijetu.

Ako izvjesno vrijeme teorija ne bude "oborena" eksperimentalnim dokazima, sve više i više naučnika se upoznaje sa njom, ako veliki broj naučnika tu teoriju smatra istinitom, oni počinju da je nazivaju zakonom.

Dobra teorija, ili zakon, moraju biti u mogućnosti da svijet opišu onakav kakav zapravo jeste. Dobra teorija takođe mora da predvidi mogućnosti kada se ona neće u potpunosti slagati sa posmatranjima. Svaki put kada se rezultati nekog eksperimenta slažu sa predviđanjem teorije ona ostaje. Ali ako se pojave rezultati nekog eksperimenta kakve teorija ne predviđa, teorija se ili prerađuje ili potpuno odbacuje.

Aristotelova teorija da je cio svijet sagrađen od četiri elementa : zemlje, vazduha, vatre i vode bila je dovoljno jednostavna i lako prihvatljiva, ali ona nije davala nikakva predviđanja. Njutnovi zakoni kretanja i zakon gravitacije nisu tako jednostavni, ali na osnovu tih zakona mogu se predvidjeti neki događaji, kao na primjer na osnovu njih je predviđeno postojanje planete Neptun, koja je stvarno i otkrivena 1845. godine.


Treba napomenuti i to da za nijednu teoriju, ma koliko puta se ona pokazala tačnom, ne može da se tvrdi da je ona nepogrešiva, da je sigurno tačna, nikada se sa sigurnošću ne može dokazati da se neće pojaviti neki eksperiment koji neće biti u suprotnosti sa datom teorijom. Hiljadu eksperimenata može potvrditi teoriju i ona ostaje da važi ali dovoljno je da se pojavi samo jedan eksperiment čiji rezultati nisu saglasni sa teorijom, i teorija je pogrešna. Ptolomejev model svemira bio je prihvaćen 1400 godina, ali iznenada je dokazano da on nije tačan. Na sličan način Njutnovi zakoni su bili prihvaćeni 200 godina, ali danas se zna da oni ne važe baš uvijek, poznati su uslovi pod kojima ovi zakoni ne važe !

2. RAZLIČITO SHVATANJE PROSTORA I VREMENA

2.1. ARISTOTEL

O pojmovima prostora i vremena prvi je razmišljao starogrčki filozof Aristotel. Aristotel je rođen u Stagiri 284. god. prije nove ere u jednoj, u to boba privilegovanoj porodici. Njegov otac bio je lični ljekar djede Aleksandra Velikog, a sam Aleksandar Veliki bio je njegov učenik.

Aristotel je bio daleko najuticajniji stari filozof nauke, njegova djela su vrlo opširna i dobro organizovana. U stvari, mnogo od toga što znamo o ranijim grčkim filozofima do



nas je stiglo prijeko Aristotela. Aristotel je dao veliki doprinos u svim oblastima filozofije. Za nas je najznačajniji njegov rad u oblasti tumačenja Univerzuma. O tim stvarima Aristotel piše u svojoj knjizi "De Caelo" ("Na nebesima"), ali tu knjigu je vrlo rano napisao pa zbog toga ona ne sadrži sva njegova razmišljanja. Aristotel je mislio da je Zemlja nepokretna, a da se Sunce, Mjesec, planete i zvijezde kreću oko nje po kružnim putanjama. Iz nekih mističnih razloga smatrao je da Zemlja centar Univerzuma, a kružno kretanje je smatrao najsavršenijim. Aristotel je tvrdio da je Zemlja nepomična, okružena sa devet

koncentričnih, providnih sfera, a iza njih nalazila se sfera "Osnovnog Pokretača", kako je on nazvao, koja održava kretanje u Univerzumu.

Za razliku od Pitagore za kojeg se Bog nalazio u centru Univerzuma, Aristotel je smatrao da se Bog nalazi van čovjeku vidljivog Univerzuma. Ipak, ne može se reći da je Aristotelov model Univerzuma bio jednostavan, čak naprotiv, njegov model Univerzuma sadržavao je 55 koncentričnih sfera !

Aristotel je bio ubjeđen da je do svih zakona koji upravljaju Prirodom moguće doći samo razmišljanjem, a izvedene zaključke nije bilo potrebno provjeravati posmatranjima, tj. eksperimentalno. U svojoj knjizi "Na nebesima" Aristotel navodi dva argumenta na osnovu kojih je zaključio da Zemlja nije ravna ploča već da je oblika lopte. Prvi razlog takvog njegovog ubjeđenja bilo je to što je utvrdio da do pomračenja Mjeseca dolazi onda kad se Zemlja nađe između Mjeseca i Sunca. Zemljina sijenka na Mjesecu uvijek je bila kružna, što jedino može da se dogodi onda kada je Zemlja lopta. Ako bi Zemlja bila ravan disk sijenka na Mjesecu bila bi izduženog oblika, nalik elipsi, osim o slučaju ako se Sunce u trenutku pomračenja nalazilo tačno ispod centra diska. Drugi razlog bio je taj što su Grci sa svojim putovanja znali da se "Sjeverna zvijezda" pojavljuje niže na nebu ako se posmatra iz južnijih krajeva nego kad se posmatra iz sjevernijih oblasti. Ne samo što je smatrao Zemlju loptom Aristotel je čak izračunao i njen obim. Na osnovu prividnog položaja Sjevernjače u Egiptu i u Grčkoj on je odredio da obim Zemlje iznosi 400.000 stadija. Nije sa sigurnošću poznato koliko iznosi jedan stadij, ali smatra se da je njega dužina otprilike 200 jardi, tj. obim Zemlje koji je Aristotel izračunao bio je 73.000 km, dva puta više nego prava vrijednost.

Aristotel je postavio i neke osnovne zakone kretanja, ali on te zakone nije postavio na način kako se to danas radi, korištenjem matematičkih formula, već je on svoje ideje i zakone izložio običnim jezikom kojim su govorili svi ljudi. Aristotelovi zakoni fizike glase :

I ZAKON, ARISTOTELOV ZAKON INERCIJE	Svako tijelo na koje ne djeluje nikakva sila, nalazi se u stanju apsolutnog mirovanja.
II ZAKON, ARISTOTELOV ZAKON KRETANJA	Sila je proporcionalna brzini ($F = mv$).
III ZAKON, ARISTOTELOV ZAKON GRAVITACIJE	Teža tijela padaju brže nego lakša tijela.


Aristotel je smatrao da data masa pređe određeno rastojanje za neki određeni vremenski interval, a da ako bi ta masa bila veća ona bi to isto rastojanje prešla za kraće vrijeme, odnosno da je vrijeme obrnuto proporcionalno masi.

Prema Aristotelovom učenju svijet je bio sagrađen od četiri elementa : zemlje, vode, vatre i vazduha, sva kretanja u prirodi bila su posljedica težnje ovih elemenata da zauzmu svoje prirodno stanje. Vjerovao je da tijela padaju na Zemlju zbog toga što je za njih "prirodno" da se tako ponašaju, zemlja je predstavljala njihov prirodan položaj, to je bilo mjesto gdje su ona pripadala, pa je zato to bio pravac gdje su ona željela da idu. U slučaju vatre Aristotel je smatrao da dim, koji se pretežno sastoji od vazduha, teži ka svom prirodnom položaju, tj. vazduhu, i zbog toga se udaljava od zemlje, odnosno kreće se na gore. U Aristotelovim učenjima takođe stoji da je prirodno stanje tijela stanje mirovanja. Sva tijela miruju dok ih neka sila primora da to stanje promijene (Aristotel pojam sile ne koristi u nama poznatom značenju, kao interakciju između tijela, već on smatra da je sila težnja nekog tijela ka svom "prirodnom" stanju). Prijema Aristotelovim zakonima teža tijela padaju brže nego lakša zbog toga što ona imaju veću težnju prirodnom položaju, veću težnju ka zemlji.

Lako se zaključuje da je u grčkom "Univjerzumu" sve težilo ka savršenstvu, ka nekoj statičnosti. U doba Aristotijela, a i vijekovima kasnije, Aristotelovi zakoni su bili neprikosnoveni. Niko nije sumnjao u njihovu ispravnost, niti je nekom padalo na pamet da proba da provjeri ove zakone fizike. Kada se prvi put javila sumnja u ispravnost Aristotelovog učenja, i kada je neko po prvi put u proučavanju svijeta upotrebio eksperiment, svari su krenule naopako za Aristotijela.

2.2. GALILEO GALILEJ (1564 – 1642)


Mnogo vijekova kasnije jedan italijanski naučnik, ne vjerujući mnogo u Aristotelove "dokaze", započeo je sistematsku analizu i eksperimentalnu provjeru zakona fizike, i time načinio suštinski preokret u shvatanju osnovnih fizičkih pojava. Taj naučnik bio je Galileo Galilej. Galilej je rođen u Pizi, Italija, 1564. godine, iste godine kada je rođen Šekspir, a umro Mikelandelo. Studirao je medicinu, ali fakultet nikada nije završio. Cio svoj život posvetio je nekim drugim naukama – fizici i astronomiji. Godine, 1592. kada mu je bilo 26 godina, prelazi iz rodne Pize u Veneciju gdje biva postavljen za profesora matematike na jednom vodećem Italijanskom univerzitetu. Tamo ostaje 18 godina. U to vrijeme Venecija je bila slobodna luka, tamo su dolazili ljudi tražeći bolji posao i bolji život, avanturisti, intelektualci i trgovci. Mediteran je bio centar svijeta, a Venecija srce Mediterana.



Galilej nije bio samo običan naučnik koji se bavio samo teorijom, on je takođe dao veliki doprinos i svojim praktičnim pronalascima pronašao je stvari koje su bile vrlo korisne, koje su donosile novac i njemu i drugima, pronalasci koji su trgovcima bili potrebni. Izumio je staklene sprave kao što su termometar za mjerenje širenja tečnosti, hidrostatičku vagu za određivanje gustine tijela (na osnovu Arhimedovih zakona), itd.

Doprinos Galileja savremenom shvatanju prostora i vremena imao je vrlo veliki značaj. Galilej je bio prvi čovjek koji je posle mnogo vijekova posumnjao u neispravnost Aristotelovih učenja i Aristotelovog shvatanja prostora, i ne samo što je mislio da je Aristotel pogrešio on je čak uspio to i eksperimentalno da dokaže ! Još u vrijeme dok je predavao matematiku u Veneciji, Galilej je bio veliki kritičar Aristotelove fizike. Prijema Aristotelu bilo je moguće utvrditi sve zakone prirode samo običnim razmišljanjem i nije bilo potrebno zaključke donijete razmišljanjem provjeravati u praksi. Iz tog razloga niko prije Galileja nije ni pokušao da bilo koji od Aristotelovih zakona fizike provjeri. Galilej je počeo od provjere Aristotelovog zakona gravitacije, odnosno htio je da pokaže da brzina kojom tijela padaju na Zemlju ne zavisi od njihove mase. Mnogi smatraju da je Galilej

ovaj zakon provjeravao puštajući tijela različitih masa sa vrha krivog tornja u Pizi, ali ova priča je najvjerojatnije pogrešna. Zapravo, Galilej je uradio nešto tome slično : puštao je



kugle različitih masa, a istih dimenzija da se kotrljaju niz jednu strmu padinu. Ova situacija je identična situaciji sa bacanjem predmeta sa vrha Tornja, ali mnogo je lakše izvesti posmatranja zbog toga što su brzine manje. Galilejeva mjerenja pokazala su da svako tijelo istom stopom povećava brzinu, bez obzira na masu, tj. ubrzanje tijela nije zavisilo od mase. Naravno, olovo će padati brže nego pero, ali ova razlika nije posljedica različitih masa ova dva tijela već različitog otpora vazduha koji na njih deluje. Godine 1609. čuo je za primitivne durbine koji su sa sevjera stigli u Veneciju. Uvećanje tih durbina bilo je vrlo malo, samo tri puta, ali to je bilo dovoljno da Galileju da ideju kako da napravi mnogo moćnije instrumente. Uspio je da napravi durbin sa uvećanjem od 10 puta, pomoću ovo durbina bilo je moguće vidjeti brodove koji su bili udaljeni dva sata plovidbe. Pored toga Galilej se sjetio da taj durbin može da okrene prema nebu, i tako je

nastao prvi teleskop. Pomoću ovog primitivnog teleskopa uspio je da otkrije Jupiterove satelite. Otkriće ovih satelita u njemu je probudilo ideju da se ne mora baš sve okretati oko Zemlje, kao što je tvrdilo Aristotelovo učenje. Shvatio je da je Aristotel pogrešio, a da je u pravu bio Kopernik, a to je mogao i da dokaže.

Zbog ove svoje ideje Galilej je došao u sukob sa Crkvom i inkvizicijom. Bio je primoran da se javno odrekne svog učenja i tako je sebe spasao sudbine Đordana Bruna i spaljivanja na lomači.

Sačuvao je život ali nije sačuvao slobodu, ostatak svog života proveo je u zatvoru.

Poslednjih 11 godina života je proveo je u kućnom pritvoru. U to doba potpuno izolovan od vanjskog svijeta napisao je i svoju posljednju knjigu, 1636. godine, kada je imao 72 godine, koju je nazvao "Nova fizika". Dvije godine kasnije ovu knjigu su objavili protestanti, ali tada je Galilej već bio potpuno slijep. Umro je kao zatvorenik u sopstvenoj kući 1642. godine, iste godine u Londonu, božićnjeg dana rođen je budući veliki fizičar – Isak Njutn. Godine 1992, tačno 350 godina kasnije, Vatikan se javno izvinuo zbog načina na koji je postupano sa Galilejem.

3. POČECI TEORIJE RELATIVNOSTI

I Aristotel i Njutn vjerovali su u apsolutno vrijeme. Smatrali su da je moguće izmijeniti interval između dva događaja, odnosno da bi ovo vrijeme bilo isto bez obzira na to ko ga mjeri, pod uslovom da se koristi dobar časovnik. Vrijeme je bilo potpuno zasebno i nezavisno od prostora. Za većinu ljudi ovo bi bilo zdravorazumsko stanovište. Pa ipak, ljudi su vremenom morali da promjene svoja viđenja prostora i vremena. Iako su, kako izgleda, zdravorazumske predstave sasvim na mjestu sa stvarima kao što su jabuke ili planete koje se kreću srazmjerno lagano, one potpuno gube valjanost kada su posrijedi stvari koje se kreću brzinom svjetlosti ili sasvim blizu nje.

3.1. MJERENJE BRZINE SVJETLOSTI

3.1.1. Mjerenje Brzine Zvuka

Osnova teorije relativnosti zasniva se na karakterističnom ponašanju svjetlosnih talasa. Za teoriju relativnosti jedna od najvažnijih osobina svjetlosti je njena brzina. Kako je po svojoj prirodi svjetlost elektromagnetni talas, onda je, ustvari, brzina svih elektromagnetnih talasa jednaka brzini svjetlosti. Ali prije nego što su uspjeli da izmjere brzinu svjetlosti, ljudi su prvo izmjerili brzinu jedne vrste malo jednostavnijih, tj. mehaničkih talasa, odnosno prvo je izmjerena brzina zvuka.

Očigledno je da su naši pretci bili svjesni činjenice da kad nešto proizvede buku zvuk se prenosi od mjesta nastanka zvuka do uha slušaoca. Ovaj zaključak je donijet na osnovu zapažanja da što je neko bio dalje od munje bilo je potrebno više vremena da čuje udar groma. Bez obzira što je ova pojava bila dobro poznata niko nije uspio da izmjeri brzinu zvuka do Srednjeg vijeka.

Jedno od prvih mjerenja brzine zvuka izveo je Francuz Mersen (1588 – 1648). Mersen je brzinu zvuka odredio na jedan vrlo jednostavan način. Na rastojanju od nekoliko kilometara postavio je top iz kojeg je njegov pomoćnik opalio. Mersen se za to vrijeme nalazio na svom osmatračkom položaju odakle je jasno mogao da vidi bljesak topa u trenutku opaljivanja. Sve što je trebalo da uradi je da izmjeri vremenski interval koji protekne između bljeska i trenutka kad čuje zvuk eksplozije. Ovaj interval je odredio brojanjem punih oscilacija klatna, pošto je u to doba klatno bila jedina poznata "štoperica". Znajući vrijeme potrebno klatnu za jedan zamah izračunao je ukupno vrijeme potrebno zvuku eksplozije da stigne do njega, a zatim tim vremenom podijelio rastojanje, na taj način dobio je brzinu zvuka. Njegov rezultat je bio vrlo precizan, iznosio je 1130 kilometara na čas. Danas mnogo tačnije metode daju vrijednost od 1210 km/h. U Mersenovo vrijeme ovo se smatralo vrlo velikom brzinom pošto je tada jedna od najvećih poznatih brzina bila brzina trkačkog konja koja je iznosila oko 64 km/h.

3.1.2. Galilejevi Pokušaji Mjerenja Brzine Svjetlosti

Svima je vrlo dobro poznato šta se dešava kad čovjek uđe u mračnu sobu i pritisne prijekidač da upali sijalicu – u istom trenutku paljenja prijekidača sijalica počinje da svijetli, a svjetlost sa nje trenutno stiže do naših očiju. Takođe je dobro poznato šta je sijalica izvor svjetlosti i da sva svjetlost koja obasjava sobu potiče od sijalice. Lako se dolazi do zaključka da bi čovjek vidjeo svjetlost ona mora da pređe put od sijalice do njegovih očiju. Čovjekova čula kazuju mu da vidi svjetlost u istom trenutku paljenja prijekidača, ali da li se svjetlost stvarno prenosi beskonačnom brzinom, ili je ta njena brzina samo toliko velika da našim čulima samo djeluje da se sve dešava trenutno ? U Srednjem vijeku bilo je dosta rasprava o tome da li je brzina svjetlosti konačna ili je beskonačna, pri čemu je i tako istaknut naučnik kao Dekart (1596 – 1650) tvrdio da je ona beskonačna, dok je Galilej (1564 – 1632) tvrdio da je ona konačna.

Da bi potvrdio da je on u pravu Galilej je probao da eksperimentom odredi brzinu svjetlosti. Ovaj eksperiment probao je da izvede na sličan način kao što je Mersen odredio brzinu zvuka. Jedne tamne noći poslao je svog pomoćnika sa upaljenim fenjerom prekrivenim kofom na jedan udaljeni brežuljak. Galilej je takođe imao fenjer pokriven kofom. Kada su obojica bili na svojim mestima, Galilej je podigao kofu sa svog fenjera i pustio svjetlost da putuje ka pomoćniku, zadatak pomoćnika bio je da u trenutku kad ugleda svijetlo sa Galilejevog fenjera odmah otkrije svoj fenjer. Svjetlosni zraci iz pomoćnikovog fenjera stigli bi do Galileja koji je mjerio ukupno vrijeme od kad je podigao kofu do prijema svjetlosnih zraka iz drugog fenjera. Mislio je da može na osnovu rastojanja između sebe i pomoćnika i izmjerenog vremena da odredi brzinu svjetlosti. Ali tu je nastupio veliki problem. Svaki put kad bi ponovio eksperiment Galilej je dobijao različite rezultate, pa iz tih rezultata nije mogao da izvede nikakav zaključak.

Tek mnogo godina posle Galileja bilo je jasno zašto Galilejev pokušaj nije uspeo. Vrijeme koje je bilo potrebo Galileju i njegovom pomoćniku da reaguju na uočenu svjetlost fenjera bilo je mnogo veće u odnosu na vrijeme potrebno svjetlosti da prevali put između njih dvojice, odnosno ako pretpostavimo da je za njihovu reakciju bila potrebna jedna sekunda za to vrijeme svjetlost bi 14 puta obišla Zemlju. Iako je ova metoda izgledala ispravna, bila je tako uzaludna kao kad bi puž pokušavao da uhvati muhu.

3.1.3. Remerova Astronomska Metoda

Posle Galilejevog neuspjeha bilo je jasno da je za određivanje brzine svjetlosti neophodno mjerenje vremena prolaska svjetlosnog zraka preko velikog rastojanja, većeg od obima Zemlje, ili da se koristi kraće rastojanje ali pod uslovom da se raspolaže preciznim časovnikom. Ubrzo posle neuspjeha Galileja javila se ideja o jednoj astronomskoj metodi, i kao ironija, jedno od Galilejevih ranih otkrića u astronomiji omogućilo je uspjeh te metode. Kao što je poznato Galilej je 1610. god. prvi put upotrijebio teleskop u astronomiji i pomoću njega otkrio četiri najveća Jupiterova satelita (kasnije nazvana Galilejevi sateliti). Kao i Mjesec oko Zemlje, svaki od njih putuje svojom orbitom oko planete, svaki u svom konstantnom vremenskom intervalu, nazvanom period.

Danski astronom Olaf Remer je 1675. godine izmjerio periode ova četiri satelita, ali je dobio drugačije rezultate kada ih je opet izmjerio nakon šest Mjeseci ! Remer je izmjerio vremenski interval potreban jednom od Jupiterovih Mjeseca od trenutka izlaska Mjeseca iz sjenke Jupitera do njegovog dolaska ispred Jupitera, a zatim natrag u isti položaj. Odredio je da taj period iznosi približno 42,5 sati kada se Zemlja nalazi u tački svoje orbite koja je najbliža Jupiteru. Nakon šest Mjeseci Zemlja će se naći na suprotnoj strani orbite oko Sunca, tj biće na najvećem rastojanju od Jupitera, a Jupiter će se na svojoj putanji pomjeriti zanemarljivo malo. Remer je sada takođe očekivao da se pomračenja Jupiterovog Mjeseca opet dešavaju u intervalima od po 42,5 sati, ali situacija je bila malo drugačija. On je našao da se pomračenja dešavaju sa sve većim i većim zakašnjenjem kako se Zemlja udaljavala od Jupitera, i nakon šest Mjeseci, kada je ona bila najdalja, ovo zakašnjenje je iznosilo 1000 sekundi.

Jedini logičan zaključak koji je Remer mogao da donese bio je da ovo dodatno vrijeme prijedstavlja vrijeme potrebno svjetlosti da pređe dodatno rastojanje između Zemlje i Jupitera, odnosno da pređe rastojanje prijeko prečnika Zemljine orbite. U to vrijeme vjerovalo se da prečnik Zemljine orbite iznosi 284 miliona, umesto tačnih 300 miliona, kilometara tako da su Remerovi podaci dali suviše malu vrijednost za brzinu svjetlosti. Ipak, Remerova metoda je ušla u storiju kao prvo uspješno određivanje brzine svjetlosti.

3.1.4. Fizova Zemaljska Metoda

Prvo određivanje brzine svjetlosti bez upotrebe astronomskih metoda izveo je Fizo u 1849. godini. U osnovi ovaj metod je podsjećao na Galilejev pokušaj ali uspeo je da prijevaziđe jedini nedostatak Galilejevog eksperimenta – imao je mogućnost tačnog

mjerenja kratkog vremenskog intervala u kome svjetlosni zrak prelazi relativno kratko rastojanje na Zemlji. Aparatura za ovaj eksperiment sastojala se od jednog zupčanika koji je okretan sistemom kotura i tegova. Izvor svjetlosti bila je upaljena svijeća. Na rastojanju od 8 km od svijeće nalazilo se jedno ravno ogledalo. U slučaju kada se kotur ne okreće svjetlost svijeće prolazi između dva zubaca, prelazi put od 8 km do ogledala i vraća se natrag istim putem, opet prolazi kroz isti prorez i stiže do oka posmatrača, koje se nalazi iza svijeće. Ako bi se sada zupčanik zarotirao svjetlosni snop koji polazi od svijeće bio bi isjeckan zupcima koji prolaze isprije svijeće. Rezultat ovoga biće niz snopova poslatih ka ogledalu, a dužina svakog snopa zavisice od brzine okretanja zupčanika; što se zupčanik brže okreće snopovi bi bili kraći. Svi ovi snopovi svjetlosti putuju do udaljenog ogledala, od njega se odbijaju i istim putem se vraćaju nazad. Kada svjetlosni snop stigne nazad do zupčanika on neometano može proći do oka posmatrača, ali isto tako može naići na prepreku, odnosno zubac zupčanika, i tu završiti svoje 16 km dugo putovanje. Jasno je da to da li će posmatrač da vidi svjetlosni snop ili ne zavisi od brzine okretanja zupčanika – ako se zupčanik okreće sporo zubac će zakloniti dolazeći svjetlosni snop, ali ako je njegova rotacija dovoljno brza svjetlost će proći kroz prorez iza zuba i posmatrač će moći da ga vidi.

Fizo je baš na ovakav način odredio brzinu svjetlosti. Eksperiment je počeo tako što je na početku zupčanik mirovao i on je nesmetano mogao da vidi svjetlosni snop koji se vraćao. Kasnije je počeo sve više i više da ubrzava zupčanik i svjetlosni snop se izgubio. Kada se snop svjetlosti opet pojavio, Fizo je zabilježio brzinu rotacije zupčanika. Znao je da svjetlost pređe put od 16 km za vrijeme koje je potrebno da jedan zubac bude zamjenjen sljedećim, a to vrijeme je mogao da odredi znajući brzinu rotacije zupčanika koju je već izmjerio. Na ovakav način Fizo je dobio da brzina svjetlosti iznosi 313.870 km/s, što je za oko 5% više nego prava vrijednost, ali bilo je to vrlo precizno mjerenje za to vrijeme kada je izvedeno.

3.1.5. Majkelsonovo Precizno Mjerenje

Sigurno najpoznatije mjerenje brzine svjetlosti izvršio je Majkelson 1926. godine. Princip eksperimenta je sličan principu koji je koristio i Fizo, sa tom razlikom što je umesto rotirajućeg zupčanika Majkelson koristio obrtno, mnogostrano ogledalo za sjeckanje svjetlosnog talasa u pojedinačne zrake. Mnogostrano ogledalo je bilo oblika šestougla, a na svakoj njegovoj strani bilo je postavljeno po jedno ravno ogledalo; ogledalo je pokretao elektromotor pa je brzina rotacije mogla precizno da se podešava. Na početku eksperimenta sistem ogledala miruje. Svjetlost polazi sa sijalice, neometano prolazi paralelno jednoj strani ogledala, stiže do udaljenog ogledala, odbija se, i vraća se nazad istim putem do oka posmatrača. Ako se ogledalo pokrene da rotira nastupiće dvije slične situacije kao i kod Fizovog zupčanika – ako ogledalo rotira nedovoljno brzo, sljedeća strana ogledala neće zauzeti dobar položaj da omogući odbijenom svjetlosnom snopu da stigne do posmatrača, ali ako bi brzina rotacije bila dovoljna, sljedeće ogledalo bi se našlo u odgovarajućem položaju i svjetlosni zrak bi stigao do posmatrača. U slučaju kada posmatrač uspije da vidi svjetlost koja se odbila sa udaljenog ogledala obrtno ogledalo ostvari jednu šestinu obrta za vrijeme koje je potrebno svjetlosti da ode i vrati se nazad. Kako je poznata brzina rotacije, i ako se određuje vrijeme putovanja svjetlosti, a kada su poznati vrijeme i pređeni put vrlo je jednostavno odrediti i brzinu.

Majkelson je radi veće preciznosti mjerenja pored šestostranog ogledala koristio i ogledalo sa 8, 12 i 16 strana. Sva ta ogledala bila su postavljena na planini Maunt Vilson u Kaliforniji. Udaljeno ravno ogledalo bilo je postavljeno na planini Maunt San Antonio, udaljenoj približno 35,5km. Iz razloga što je tačnost rezultata mnogo zavisila od tačnosti mjerenja rastojanja između ovih ogledala, Služba za obalska i geodetska premjeravanja (U.S. Coastal and Geodetic Survey) izmjerila je to rastojanje isključivo za Majkelsonov eksperiment sa greškom manjom od 5 cm. Zahvaljujući preciznosti sa kojom je obavljana svaka etapa eksperimenta, rezultati se mogu smatrati tačnim do malog dijela jednog

procenta. Kao rezultat ovog i kasnije izvedenih eksperimenata mi danas znamo da je brzina svjetlosti približno 300.000 km/s (ili preciznije 299.792.458 m/s).

3.2 POTRAGA ZA ETEROM

3.2.1. Ideja O Stacionarnom Eteru

Još mnogo godina prije prijeciznog mjerenja brzine svjetlosti bilo je poznato da je za prostiranje zvučnih, odnosno mehaničkih talasa, neophodno postojanje neke sredine kroz koju bi isti putovali. Postojanje sredine kroz koju talas putuje uslovljeno je time što se talas prostire prijenosjenjem vibracija sa jedne čestice na drugu. Kao posljedica neophodnosti postojanja sredine bilo je poznato da zvučni talasi ne mogu da putuju kroz vakum, a to je i eksperimentalno potvrđeno. Druga vrsta svima poznatih talasa bili su vodeni talasi za čije je prostiranje bila neophodna voda, ovi talasi bez vode koja ih je nosila nisu mogli da postoje. Nakon svega ovoga potpuno je razumljivo zašto su ljudi smatrali da je i za prostiranje svjetlosti, odnosno elektromagnetnih talasa, neophodno postojanje neke sredine kroz koju bi ovi putovali, odnosno mora da postoji neka supstanca šije bi čestice vibrirale i na taj način prijenosile svjetlosni talas.

Ali nasuprot ideji o postojanju neke supstance koja je ispunjavala cijelokupan prostor univjerzuma, pouzdano se znalo da u ogromnom prostranstvu između planeta i zvijezda nema nikakvog medijuma, ceo taj prostor bio je vakum. Niko nije mogao da povjeruje da svjetlost putuje 150 miliona kilometara od Sunca do Zemlje kroz prazan prostor, niko nije vjerovao da za prostiranje svjetlosti nije potreban nikakav medijum, pa su za tog hipotetičkog prijenosioca svjetlosti stvorili posebnu reč i nazvali su ga lumeniferoznim (svjetlosnim) eterom. Prijema toj ideju eter je postojao svuda gde su svjetlosni talasi putovali, i ispunjavao je sav vasijski prostor koji su do tada svi smatrali da je prazan. Ideja o postojanju etera je svima delovala vrlo logičnom i ubrzo je eter prihvaćen kao jedan od materijala u vasioni. Neki naučnici su čak išli toliko daleko da su pokušavali da izračunaju gustinu etera !

Godine 1864. pojavila se potpuno neočekivano dodatna potvrda za postojanje etera. Te godine je Maksvel objavio rezultate svojih matematičkih istraživanja električnih vibracija. On je pokazao da bi neke električne vibracije mogle izazvati stvaranje električnih talasa koji bi putovali kroz prostor, a izračunao je i brzinu kojom bi ti trebali da se kreću, dobijena vrednost za brzinu bila je jednaka izmjerenoj brzini svjetlosti. Na osnovu svojih istraživanja Maksvel je kasnije, potpuno ispravno, zaključio da svjetlost nije ništa drugo nego jedan specijalan tip njegovih elektromagnetnih talasa. Godine 1887. Herc je eksperimentalno potvrdio Maksvelovo matematičko predviđanje postojanja elektromagnetnih talasa. Sada je problem postojanja medijuma kroz koji putuju elektromagnetni talasi bio još ozbiljniji. Naučnici su vjerovali da mora da postoji neki medijum gde bi boravila električna i magnetna polja, nije se moglo zamisliti da ta polja postoje u vakuumu. Smatralo se da je za prostiranje elektromagnetnih talasa bilo neophodno postojanje nekog medijuma koji bi ih nosio, a jedini logičan medijum bio je eter. Razumljivo je očekivati da su naučnici tog vremena probali da detektuju eter. Smatralo se da ako bi eter postojao on bi morao da ispunjava sav vasijski prostor, a na osnovu toga zaključeno je da bi on trebao da bude jedina stvar koja se ne kreće. Sve ideje o postojanju etera bile su vrlo obične i lako prihvatljive, trebalo je još samo detektovati taj eter. Ako se bi se nalazili na brodu koji plovi morem i želimo da znamo da li se brod kreće ili ne ona sve što treba da uradimo je da pogledamo da li se voda kreće uz brod ili jednostavno da ispružimo ruku u vodu. Na sličan način naučnici su probali da provjere da li se Zemlja kreće kroz eter ili ne, oni su probali da detektuju kretanje etera, ili kako su tu pojavu nazvali eterski vetar. Na nesreću eterski vetar nije mogao da se detektuje samo jednostavnim pružanjem ruke u okolni prostor da bi se on osetio.

3.2.2. Očekivani Efekt Etera

Kao posledica eterskog vetra morali su da postoje neki efekti za kojima se uporno tragalo. Jedan od najčešće korišćenih efekata u pokušaju detekcije etra bio je vezan sa "pomeranje" svetlosnih talasa koji kroz eter putuju.


Prijetpostavimo da u žiži jednog teleskopa uhvatimo jednu zvijezdu u pravcu kojim se Zemlja kreće po svojoj orbiti. Dalje prijetpostavimo da u teleskop ulaze dva svetlosna snopa koja su stigla sa zvijezde. Sočiva teleskopa prijelamaju ove zrake i oni se seku u žiži unutar teleskopa. Kako se posmatrač, zajedno sa cijelom planetom, kreće brzinom od 30 km/s ka zvijezdi, oko posmatrača će stići u tačku gde je bila žiža u isto vrijeme kad i svetlosni snopovi stižu u tu tačku i posmatrač će videti zvijezdu. Kada posmatrač bude posmatrao istu zvijezdu nakon šest Mjeseci, kada se Zemlja bude nalazila na suprotnom kraju svoje orbite, a ne promeni fokus. Situacija će biti sasvim drugačija, Zemlja se sada udaljava od zvijezde kroz eter brzinom od 30 km/s. Kako se sada teleskop i posmatrač udaljavaju od dolazećeg svetlosnog talasa posmatračevo oko neće više biti u tački žiže kada svetlosni snop tu stigne, kao posledica ovoga posmatrač neće videti oštru sliku zvijezde. Za ovim efektom se uporno tragalo ali niko nije uspeo da ga detektuje.

3.2.3. Majkelson-Morlijev Eksperiment

Bez obzira na sve neuspehe u pokušaju detekcije etera niko nije dovodio u sumnju njegovo postojanje. Svi su smatrali da potreban mnogo osetljiviji eksperiment. Takav eksperiment zamislili su i izveli Majkelson i Morli 1881. godine.

Eksperiment koji su Majkelson i Morli izveli zasnivao se na vrlo jednostavnom principu. Ako bi smo zamislili takmičenje dva identična aviona. Neka ta dva aviona istovremeno krenu iz tačke A, jedan ka tački B a drugi ka tački C (vidi sliku). Prvi avion treba da leti na sever do tačke B a zatim nazad na jug do tačke A, a drugi na istok do tačke C a zatim nazad u pravcu zapada do tačke A. Prijetpostavićemo još da se tačke B i C nalaze na istom rastojanju od A i neka to rastojanje iznosi 800 km. Ako bi maksimalna brzina oba aviona bila 1600 km/h i ako nema vetra lako je zaključiti da će trka završiti za jedan sat, nerešenim rezultatom.

Ako bi sada prijetpostavili duva vetar sa istoka ka zapadu brzinom od 160 km/h, trka se ne bi završila bez pobednika, a pobednik bi bio prvi avion. Prvi avion bi pobedio iz razloga




što bi drugom avionu vetar koji duva "u lice" dopustio da se kreće brzinom od 1440 km/h jer se njegova maksimalna brzina od 1600 km/h odnosi na miran vazduh. U povratku bi drugi avion imao vetar "u leđa" i njegova brzina bi sada bila 1760 km/h, ali kako više vremena provodi krećući se manjom brzinom njegova prosečna brzina bi bila manja od prvog aviona. Naravno, i prvi avion tokom cijelog puta ima bočni vetar koji malo skreće avion da bi kompenzovao uticaj vetra, pa vetar i ovde dovodi do usporenja, pa i prvi avion ima prosečnu brzinu nešto manju od 1600 km/h, ali veću od drugog aviona. Ako bi se izračunala vremena putovanja oba aviona dobija se da prvi avion završava trku za 1 h i 18 sec, a drugi za 1 h i 36 sec. Lako se zaključuje da u slučaju da su pravac i brzina vetra nepoznati oni

mogu da se odrede iz rezultata trke. Upravo na tom principu se zasniva i Majkelson-Morlijev eksperiment. Umesto dva aviona Majkelson i Morli su "organizovali" trku dva svetlosna talasa, koji su međusobno bili normalni.

Aparatura koja je korišćena u ovom eksperimentu prikazana je na slici. Aparatura je postavljena tako da se Zemlja kreće u desno i pri tome bi trebalo da se oseti "duvanje" eterskog vetra.

Svjetlosni talas kreće od svjetlosnog izvora, udara u poluposrebrano ogledalo koje deli talas na dva talasa podjednakog intenziteta. Talas A ide kroz poluposrebrano ogledalo do ravnog ogledala A, a talas B se reflektuje od poluposrebranog ogledala do ogledala B. Ova dva pojedinačna talasa odgovaraju avionima iz prijetodnog primera. Talas A se reflektuje od ogledala A i vraća nazad do poluposrebranog ogledala gde se jedna njegova polovina reflektuje do mikroskopa (druga polovina prolazi kroz ogledalo i vraća se do izvora ali to nema značaja za rezultat eksperimenta). Talas B se na identičan način reflektuje od ogledala B, vraća do poluposrebranog ogledala odakle opet jedna njegova polovina odlazi do posmatračevog mikroskopa. Posmatrač tada registruje oba talasa u mikroskopu i sve što sada prijeostaje je "foto-finiš". Da bi se izvršila analiza završne pozicije i odredilo koji je talas "pobedio" koristi se jedna pojava zapažena kod talasnog kretanja koja se naziva interferencija. Ako dva talasa ulaze u mikroskop (slika) i ako su njihovi trbusi i doline poravnati (tj. talasi su u "fazi") dolazi do njihovog pojačavanja, i posmatrač će videti svijetliji talas od bilo kog od pojedinačnih. Ovakav rezultat se naziva konstruktivna interferencija.



Ako bi se jedan talas našao neznatno isprijed ili za drugog, posmatrač bi video nešto tamniji talas od dolazećih. Ovakav rezultat nazvan je parcijalna interferencija. Treća mogućnost koja može na nastupi nazvana je destruktivna interferencija. Ovaj tip interferencije nastaje kada se bregovi jednog talasa poklope sa dolinama drugog i tada dolazi do međusobnog poništavanja ova dva talasa. Uređaj koji radi na principu interferencije naziva se interferometar. Majkelson i Morli su očekivali da će pod uticajem eterskog vetra doći do pomeranja talasa A i B tako da oni više ne budu u fazi, a posmatrač bi trebalo da vidi svjetlost slabijeg intenziteta. Majkelson i Morli su ovaj eksperiment izvršili više puta. Ponavljali su eksperiment u različito doba dana, i u različito doba dana i u različito doba godine, ali rezultati su uvijek bili identični, eterski vetar nije detektovan. Eksperiment Majkelsona i Morlija je kasnije ponavljan sa sve većom tačnošću, ali rezultati su uvijek bili isti.

Na ovaj način moderna nauka je bespogovorno vjerifikovala zaključak Majkelsona i Morlija i sada je opšte prihvaćeno da se eter ne može detektovati.

3.2.4. Velika Dilema

Situacija u nauci je postala prilično zamršena. Čvrsto se vjerovalo u postojanje etera, ali ne samo što su svi pokušaji da se eter detektuje završili neuspješno, nego su razlozi ponuđeni za objašnjenje neuspeha bili kontradiktorni i nepouzdaniji. Dakle, da li eter postoji ili ne? Ako postoji, zašto ga ne možemo detektovati? A ako ne postoji, zašto ne postoji?

Upravo u takvoj klimi naučnog neraspoloženja i konfuzije dat je odgovor koji je dao veoma jedinstveno, i do tada nezamislivo, objašnjenje da je trebalo biti genije i videti ga. Taj genije bio je Albert Ajnštajn, a sa njim se rodila i Teorija relativnosti.

4. SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI

Početkom XX vijeka Ajnštajnova teorija relativnosti šokirala je svijet. Ova teorija predviđala je drastične promjene zakona klasične fizike koji su vijekovima bili logični, i niko vijekovima nije sumnjao u njihovu ispravnost.

Aristotel, Njutn i svi drugi naučnici prije Anštajna vjerovali su u apsolutno vrijeme. Smatrali su, naime, da je bespogovorno moguće izmeriti interval između dva događaja, odnosno da bi ovo vrijeme bilo isto bez obzira na to ko ga meri, pod uslovom da se koristi dobar časovnik. Vrijeme je bilo potpuno zasebno i nezavisno od prostora. Za većinu ljudi ovo bi bilo zdravorazumsko stanovište. Ali ipak, čovječanstvo je moralo da promeni svoja viđenja prostora i vremena. Iako su, kako izgleda, zdravorazumske prijedstave sasvim u redu sa stvarima kao što su jabuke ili planete koje se kreću srazmerno lagano, one potpuno gube valjanost kada su posredi stvari koje se kreću brzinom svjetlosti ili sasvim blizu nje. Najznačajnija stvar koja je doprinela nastanku Teorije relativnosti bilo je to što je Ajnštajn u fiziku uveo jedan nov pojam, pojam prostor-vremena, ovo ujedinjenje prostora i vremena, tj. posmatranje vremena kao jedne posebne dimenzije, ulazak u jedan nov četvorodimenzionalni prostor, dovelo je do mnogih čudnih pojava.

Teorija relativnosti sastoji se od dva glavna dela : Specijalna teorija relativnosti (STR), objavljena 1905. god i Opšta teorija relativnosti (OTR), objavljena 1916. godine. STR razmatra samo prijedmete ili sisteme koji se, jedni prijema drugima, kreću ili konstantnom brzinom (neubrzani sistemi) ili se uopšte ne kreću (brzina jednaka nuli). OTR razmatra prijedmete ili sisteme koji se jedni prijema drugima kreću sa određenim ubrzanjem (ubrzavaju ili usporavaju).



Naslovne strane specijalne i opšte teorije relativnosti

4.1. POSTULATI SPECIJALNE TEORIJE

Upoznavši se sa svim problemima nastalim tokom vršenja eksperimenata u pokušaju detekcije etera Ajnštajn je izveo dva veoma značajna zaključka. Ti zaključci poznati su kao dva osnovna postulata STR, i oni su temelj na kome se gradi cijela teorija.

Svi fizički zakoni izražavaju se u istom obliku u svim sistemima koji se kreću ravnomerno pravolinijski

Prvi postulat : Svi fizički zakoni izražavaju se u istom obliku u svim sistemima koji se kreću ravnomerno pravolinijski. Ovaj postulat prijedstavlja tzv. Ajnštajnov princip relativnosti, koji Galilejev princip relativnosti uopštava sa mehaničkih na sve fizičke zakone. Iz ovog postulata se takođe izvodi i zaključak da se eter ne može detektovati. Ajnštajn je do ovog postulata došao vrlo jednostavnim razmišljanjem.

Zamislamo čovjeka koji se nalazi u vozu i posmatra vagon drugog voza koji se nalazi neposredno pored njega. Ako jedan od ova dva voza krene, čovjek bi lako mogao da



dode u zabunu koji se voz zapravo kreće. Naravno, ovde je lako odrediti ko se zapravo kreće, potrebno je samo pogledati bilo koji predmet pored pruge, ali zamislamo sada nekog posmatrača u dalekoj budućnosti. Neka taj čovjek krene sa Zemlje na svemirsko putovanje, i neka se on konstantno kreće brzinom od 8.000 km/h u odnosu na Zemlju. Dok on tako krstari kroz prostor i izgubi Zemlju iz vida, odjednom iza sebe opaža drugu raketu, i biva iznenađen lakoćom kojim ga ova raketa prijetiče. Vozač ove druge rakete čak može da pomisli da se raketa koju zaobilazi uopšte ne kreće ! Kako će ovaj "zvjezdani putnik" da dokaže da se kreće ? Sve što

može da odredi je brzina kojom je druga raketa prošla pored njega, i ništa više od toga. Ako bi ova brzina bila 1.600 km/h može se doći do više različitih zaključaka.

Najrealniji zaključak je taj da pošto pilot zna da se on kreće brzinom od 8.000 km/h u odnosu na Zemlju, a da je druga raketa prošla brzinom od 1.600 km/h pored njega, brzina te druge rakete u odnosu na Zemlju 9.600 km/h, ali ovo ne mora biti tačno ! To isto tako može da znači da se on sada kreće brzinom od 3.000 km/h a druga raketa brzinom od 4.600 km/h u odnosu na Zemlju. Ili, ma koliko to izgledalo čudno, možda se ova druga raketa uopšte ne kreće u odnosu na Zemlju a da se posmatrač kreće unazad, brzinom od 1.600 km/h !

Brzo se dolazi do zaključka da je bez korišćenja nekog "nepokretnog" predmeta radi mjerenja brzine posmatrača nemoguće reći ko se kreće a ko miruje, ako neko uopšte miruje. Nemoguće je napraviti neki instrument koji bi pokazivao da li se posmatrač u odnosu na nešto kreće ili ne. U stvari ako bi se posmatrač nalazio negde daleko od svih zvijezda i planeta, bez ičega što bi mogao da koristi kao referentnu tačku za mjerenje brzine, on nikad neće saznati da li se kreće ili ne ! Ovo je bila činjenica do koje je Ajnštajn došao - *svako kretanje je relativno*. Nikada ne možemo govoriti o apsolutnom kretanju, već samo o kretanju u odnosu na nešto drugo. I uopšte se ne može reći da se neki predmet kreće tom-i-tom brzinom, već se mora reći da ima tu-i-tu brzinu u odnosu na nešto. Lako se može zamisliti razgovor koji će se odvijati negde u budućnosti između oca i njegovog sina koji uživa u putovanju kroz vasiona prostranstva. Otac upozorava sina da svoju raketu ne vozi brže od 1600 km/h, a sin mu odgovara: "U odnosu na Sunce, tata, ili na Sirijus ?" Iz ovoga se lako zaključuje zašto stacionarni eter ne može da se detektuje. Ako bi on postojao i ispunjavao cijelokupnu vasionu, morao bi da miruje, njegovo mirovanje bi bilo apsolutno, a Prvi postulat upravo kaže da ne postoji apsolutno mirovanje.




Brzina svjetlosti, odnosno maksimalna brzina prijenosa interakcije, ista je u svim inercijalnim sistemima

Drugi postulat : STR kaže da je brzina svjetlosti, odnosno maksimalna brzina prijenosa interakcije, ista u svim inercijalnim sistemima. Ako bi se jedan dečak nalazio

na platformi i bacio loptu brzinom od 24 km/h to znači da bi se lopta u odnosu na njega kretala tom brzinom bez obzira da li se platforma kreće ili ne. Ako bi se platforma kretala, na primer, prijema mostu brzinom od 8 km/h a dečak baci loptu prijema mostu brzina lopte i platforme će se sabrati i dati ukupnu brzinu lopte u odnosu na most, i tom brzinom će lopta udariti u most. Ako bi se platforma udaljavala od mosta a dečak opet bacio loptu ka mostu brzina lopte u odnosu na most bila bi jednaka razlici brzina platforme i lopte.

U malo složenijoj situaciji, gde ulogu dečaka igra neka daleka zvijezda, mosta – teleskop na Zemlji, a ulogu lopte prijeuzima svjetlosni talas koji putuje sa zvijezde do Zemlje situacija se malo komplikuje. Svjetlosni talas sa zvijezde putuje brzinom od 300.000 km/s u odnosu na zvijezdu. Ako bi se zvijezda i Zemlja približavale relativnom brzinom od 160.000 km/s, analogno situaciji sa dečakom, očekivali bi smo da se brzine sabiraju, odnosno svjetlosni talas bi trebalo da "udari" u teleskop brzinom od 460.000 km/s, i obrnuto ako se zvijezda i Zemlja udaljavaju brzine bi trebalo da se oduzimaju i daju 140.000 km/s. Na ovakav način posmatrač bi odredio dve različite brzine svjetlosti, i to je potpuno ispravno sa stanovišta Njutnove fizike, ali je u suprotnosti sa Drugim postulatom. Prijema Drugom postulatu brzina svjetlosti u oba slučaja mora da iznosi 300.000 km/s.

Iskaz ovog postulata bio je revolucionaran. Ipak, Ajnštajn ga je uzeo kao jedan od osnovnih postulata STR, bez obzira na to što je izgledalo da je u suprotnosti sa zdravim razumom, jer su svi eksperimenti navodili na taj zaključak. Vjerovalo se da je to jedan od osnovnih zakona vasiona. Kako su ova dva postulata bila u takvoj suprotnosti sa opštim mišljenjem tog vremena, bilo je neophodno mnogo više od njihovog prijedstavljanja javnosti. Jer, bez dalje potpore, oni bi samo bili interesantni a ne bi dokazivali ništa: Tako su, polazeći od ovih postulata izvedene mnoge jednačine koje su ne samo objašnjavale određene fenomene, nego su omogućavale i izvesna predviđanja, koja su kasnije bila eksperimentalno vjerifikovana. To je ustvari najstrožija provjera svake teorije: ne samo da omogući zadovoljavajuće objašnjenje svih zagonetki nekog problema, nego da učini i potpuno nova i drugačija predviđanja koja će tek kasnije biti eksperimentalno potvrđena.



Da bi se prijemostila praznina između ovih postulata, koji su sami po sebi apstraktni, i jednačina koje vode do potvrde i praktičnih primena teorije, postulati su morali biti ugrađeni u fizičku situaciju podložnu eksperimentalnoj provjeri. Kako se postulati odnose na prijedmet koji se kreće konstantnom brzinom u odnosu na posmatrača i na ponašanje svjetlosnih talasa, ovo se najbolje može postići ako zamislimo posmatrača koji "opisuje" prijedmet koji se kreće konstantnom brzinom u odnosu na njega. Ponašanje svjetlosnih talasa će uticati na opis jer je refleksija svjetlosnih talasa od prijedmeta do posmatrača ono što omogućava posmatraču da vidi i opiše prijedmet. Posmatračev "opis" prijedmeta sastojaće se od fizičkih karakteristika koje se mjere posmatračevim instrumentima (npr. dužina, masa, energija, vrijeme...)

Predviđanja numeričkih vrednosti ovih karakteristika u skladu sa STR stavljaju se u matematički oblik da bi mogla da se uporede sa stvarnim mjerenjima. Ako pretpostavimo da se dve identične rakete A i B kreću jedan prijema drugoj konačnom brzinom. Obe rakete su oprijemljene najelementarnijim naučnim instrumentima, lenjirom i časovnikom, koji su prijetodno upoređeni tako da se zna da su instrumenti u raketi A identični instrumentima u raketi B. Analiza počinje u trenutku kad B prolazi pored A, njihovi časovnici pokazuju isto vrijeme, i u tom trenutku događa se eksplozija obližnje supernove. Ni raketa A ni raketa B još nisu svesne da je zvijezda eksplodirala, jer svjetlosni talasi još nisu stigli do njih. Posle kraćeg vremena svjetlosni talasi nastali prilikom eksplozije stižu do raketa A i B koje će u tom trenutku biti na rastojanju x.

Prijema II postulatu posmatrač na A i B vide svjetlosne talase koji dolaze istom brzinom u odnosu na njih, tako da ako c prijedstavlja brzinu svjetlosnog talasa za A, a c' za B, onda se može reći da je $c=c'$. Sada se unesu rastojanja d i d' (između zvijezde i posmatrača) i vremena koja pokazuju njihovi časovnici t i t' , i analiza produži da bi se uračunalo njihovo međusobno rastojanje, njihova relativna brzina, njihova vremena, brzina svjetlosti, itd. Jednačine koje se dobijaju nazivaju se jednačine Lorencovih transformacija, jer je Lorenc prijetodno došao do istih jednačina na osnovu svoje teorije. Koristeći jednačine Lorencovih transformacija možemo sada predvideti rezultate koje će posmatrač sa jedne rakete dobiti za masu, dužinu i td. druge rakete. Kako postulati sadrže rezultate koji su u suprotnosti sa svakodnevnim iskustvom, rezultati koji se dobijaju na osnovu Lorencovih transformacija mogu biti neočekivani i naizgled čudni. Razlog što se Teorija relativnosti, uopšte uzev, smatra neshvatljivom, nije to što je teško razumeti njene rezultate, nego što je u njih teško povjerovati.

4.2. KONTRAKCIJA DUŽINE


Ako bi posmatrač na raketi A bio u mogućnosti da izmeri dužinu rakete B kada se one jedna prijem drugoj kreću brzinom v , matematički rezultat će predviđati da će B izgledati kao da se skratila, a njena dužina biće data formulom :

$$L' = L \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

gdje je L' dužina koju A dobija za B, a L je stvarna dužina B, v njihova relativna brzina, a c brzina svjetlosti.

Ako bi rakete A i B imale dužinu od po 5 metara kada jedna u odnosu na drugu miruju. Kada se rakete udaljavaju brzinom od 150.000 km/s onda se na osnovu jedn. (1) određuje da je prividna dužina rakete B, mjerena sa A, 4,33 metara. Ako bi se udaljavale brzinom od 260.000 km/s onda će gledano sa rakete A dužina rakete B biti približno 2,5 metara. Ista ova formula važi i ako posmatrač iz rakete B meri dužinu rakete A. Na rezultat ne utiče to da li se rakete udaljavaju jedna od druge ili se približavaju. Rezultat zavisi samo od njihove relativne brzine.

Ako bi posmatrač na raketi A mjerio dužinu svoje rakete bez obzira na kretanje rakete B, on će uvijek dobiti da je dužina njegove rakete 5 metara, jer se rakete ne kreće u odnosu




na samu sebe. Isto važi i za posmatrača u raketi B, za njega će dužina rakete B uvijek iznositi 5 metara. Ovaj efekat kontrakcije dužine može se jednostavno iskazati: uvijek kad se jedan posmatrač kreće u odnosu na drugog, bez obzira da li se približava ili udaljava, obojici će izgledati da se onaj drugi skratio u pravcu kretanja. Međutim, nijedan posmatrač neće zapaziti nikakvu promenu u svom sistemu. Efekat kontrakcije dužine zapaza se samo pri brzinama koje su približne brzini svjetlosti. Kako su skoro sve brzine poznate na Zemlji, u svakodnevnom životu, nemoguće je zapaziti efekat kontrakcije. Ako bi se na primer avion kretao brzinom od 1.200 km/h u odnosu na posmatrača, na osnovu jednačine (1) može se izračunati da će se on skratiti za nekoliko milionitih delova milionitog dela centimetra, otprilike za priječnik jednog atomskog jezgra. Ovako mala skraćjenja nemoguće je detektovati ni najsavršenijim instrumentima, a kamoli golim okom.

4.3. PORAST MASE SA BRZINOM

Prijetpostavimo sada da rakete A i B imaju jednaku masu kada su na Zemlji i kada su jedna prijema drugoj u relativnom mirovanju. Neka masa raketa iznosi po 1.000 kg. Ako posmatrač iz rakete A meri masu rakete B kada se one relativno kreću, videće da se masa rakete B povećala i da je njen iznos dat formulom :

$$m' = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

gde je m' vrednost koju A dobija za masu B, m je prvobitna masa B ili, kako se drugačije ona naziva, masa u mirovanju, v je njihova relativna brzina, a c brzina svetlosti. Na osnovu jednačine (2) dolazi se do zaključka da ako rakete A i B imaju masu od po 1.000 kg dok miruju na Zemlji, onda će kad se budu kretale relativno brzinom od 150.000 km/s izgledati da B ima masu od 1.200 kg posmatrano iz rakete A. Pri brzini od 260.000 km/s posmatrač iz rakete A izmeriće da B ima masu od oko 2.000 kg !



Ako bi posmatrač iz rakete B takođe merio masu rakete A dok se one relativno kreću jedna u odnosu na drugu, zaključio bi da se i masa rakete A povećava saglasno formulu (2). Ako posmatrači u raketi A i B mjere masu svoje rakete oni će uvijek dobiti da masa njihove rakete iznosi tačno 1.000 kg, nezavisno od toga da li se raketa kreće ili ne, jer se ona sigurno ne kreće u odnosu na samu sebe. Kao slikovit primer porasta mase sa brzinom može se navesti brod koji plovi okeanom. Brod za sobom uvijek povlači izvesnu količinu vode. Što brže plovi, više vode će povlačiti za sobom. Zbog toga izgleda kao da brod povećava svoju masu što brže plovi, jer voda koju povlači za sobom kreće se zajedno sa brodom i postaje deo brodskog tovara. Treba napomenuti i to da porast mase ne znači da se predmet povećao u smislu fizičkih dimenzija (dužina, širina, visina), čak štaviše ne samo da se predmet nije povećao on je postao manji !

4.4. SABIRANJE BRZINA

Neka se posmatraču istovremeno približavaju voz i automobil, i to oba brzinom od po 100 km/h u odnosu na posmatrača. Prijema tome, ako bi posmatrač merio brzinu voza i automobila dobio bi da ta brzina iznosi tačno 100 km/h. I obrnuto ako bi mašinovođa ili vozač automobila merili svoju brzinu u odnosu na posmatrača dobili bi isti rezultat. Ali, ako bi mašinovođa izmerio svoju brzinu u odnosu na automobil dobio bi da ona iznosi 200 km/h, jer se i voz i automobil kreću u odnosu na nepokretnog posmatrača brzinom od 100 km/h. Isto važi i za vozača automobila, i on se u odnosu na voz kreće brzinom od

200 km/h. Ovakve situacije su vrlo česte u svakodnevnom životu i redovno se koristi jednačina (3) :

$$v_{AB} = v_A + v_B$$

gde je v_{AB} relativna brzina kojom se A kreće u odnosu na B (tj. brzina voza u odnosu na automobil, ili obrnuto), v_A i v_B je brzina A, tj. B, u odnosu na posmatrača.

Ako bi se posmatrač sada našao u sličnoj situaciji samo što bi umesto voza posmatrao svemirski brod A koji se kreće brzinom svjetlosti, a umesto automobila drugi svemirski



brod B koji bi putovao brzinom jednakoj polovini brzine svjetlosti on bi lako odredio brzine ova dva svemirska broda. Piloti u brodovima takođe lako određuju svoje brzine u odnosu na posmatrača, ali šta će se desiti kada pilot jednog broda, npr. broda B, proba da odredi svoju brzinu u odnosu na drugi brod A ? Vođen prijetnom logikom od bi dobio da brzina broda B u odnosu na A iznosi 1,5c, tj 450.000 km/s. Ako bi brzina broda B u odnosu na posmatrača bila 0,99999...c i pilot sada proba da odredi brzinu u odnosu na brod A on bi trebalo da dobije da je brzina 1,99999...c ali

prije STR ne važi jednačina (3) i relativna brzina broda B u odnosu na brod A biće jednaka brzini svjetlosti u oba ova slučaja ! Specijalna teorija relativnosti daje jedan novi zakon za određivanje relativnih brzina i taj zakon iskazan je formulom:

$$v_{AB} = \frac{v_A + v_B}{1 + \frac{v_A \cdot v_B}{c^2}} \quad (4)$$

gde su v_A i v_B relativne brzine kojima se A i B kreću prije nepokretnom posmatraču, a c je brzina svjetlosti.



Ako bi na primer uzeli da brzine v_A i v_B iznose po 160.000 km/s, relativna brzina tijela A prije telu B bila bi 320.000 km/s prije jednačini (4), a ne 320.000 km/s kako daje jednačina (3). Lako se uočava da ovde dve jednačine daju dve različite vrednosti za jednu istu stvar pa prije tome ne mogu obe da budu ispravne ! Za sve praktične primene jednačina (3) se može smatrati ispravnom kada su brzine znatno manje od brzine svjetlosti, ali kada su brzine približne brzine svjetlosti mora se koristiti jednačina (4). Videli da

razlika u vrednostima koje daju ove dve jednačine pri brzinama od 160.000 km/s iznosi 70.000 km/s, ali ako bi brzine bile na primer 160 km/h, rezultat koji daje jednačina (3) razlikovao bi se od rezultata jednačine (4) za oko dva milionita dela santimetra.

4.5. MAKSIMALNA MOGUĆA BRZINA

Od svih predviđanja koja proizilaze iz STR, vjerovatno je najčudnije ono da postoji određena brzina prije koje se ništa ne može kretati. Koja je to brzina lako se može naslutiti iz jednačine (1), koja određuje skraćivanje prijedmeta sa brzinom. Na osnovu te jednačine vidi se da prijedmet postaje sve kraći i kraći kako se brzina povećava. Ako brzina postaje sve veća i veća prijedmet će se sve više smanjivati, kada njegova brzina bude približna brzini svjetlosti dužina će biti približna nuli, u onom trenutku kada brzina postane jednaka brzini svjetlosti prijedmet će nestati. Ako prijetpostavimo da brzina nastavi da raste. Ako bi brzina bila dva puta veća od brzine svjetlosti, tj. $v=2c$, pod korenom se dobija -3 , odnosno dužina prijedmeta je sada prvobitna brzina pomnožena sa korenom iz -3 . Kako je kvadratni koren iz negativnog broja imaginaran broj to znači da će i dužina prijedmeta biti imaginarna, tj. prijedmet neće postojati.

Na osnovu jednačine (2) moguće je odrediti šta će se dešavati sa masom prijedmeta kada se njegova brzina približava brzini svjetlosti. Sa porastom brzine, izraz pod korenom se smanjuje. Kako vrednost razlomka raste kako mu se imenilac smanjuje, masa prijedmeta raste. Ako brzina v toliko poraste da se izjednači sa brzinom svjetlosti, onda će imenilac postati jednak nuli, što znači da će masa postati beskonačno velika.

Iz ovoga moguće je izvući samo jedan zaključak – da je brzina svjetlosti maksimalna moguća brzina. Nijedan prijedmet ne može putovati brže od svjetlosti, jer ne samo što mu se dužina smanjuje na nulu nego će i njegova masa postati beskonačno velika. Ustvari, tačnije je reći da se materijalni prijedmeti koji su poznati u svakodnevnom životu nikada ne mogu kretati brzinom svjetlosti jer bi njihova masa tada postala beskonačno velika, što znači da bi bilo potrebno beskonačno mnogo energije da se dovedu do te brzine. Na osnovu ovoga vidi se zašto je neophodna jednačina (4). Ako bi koristili samo jednačinu (3) u nekim slučajevima relativna brzina dva tijela mogla bi da bude veća od brzine svjetlosti, što je nemoguće. Bez obzira na brzinu kojom se dva prijedmeta kreću u odnosu na nekog posmatrača, njihova relativna brzina uvijek je manja od brzine svjetlosti.

4.6 EKVIVALENTNOST MASE I ENERGIJE

Najznačajnije predviđanje STR bilo je to da je srazmerno mala količina mase ekvivalentna ogromnoj količini energije. Danas je dobro poznato da je prvi ubedljiv dokaz ovog predviđanja bila eksplozija prve atomske bombe kod Alamogorda (Nju Meksiko, SAD) 16. Jula, 1945. godine. Kako STR predviđa da sa porastom brzine raste i masa tijela, zaključuje se da i energija tijela mora da raste jer masivniji prijedmet ima veću energiju od lakšeg ako su im brzine jednake. Moguće je pokazati da je dodatna energija, koja je povezana sa dodatnom masom, jednaka porastu mase pomnoženim sa kvadratom brzine svjetlosti. Na osnovu ovakvog razmišljanja Ajnštajn je zaključio da je sva masa povezana sa energijom, a ta veza data je njegovom čuvenom formulom :


$$E = mc^2$$

gde je E ekvivalentna energija, m masa tijela, a c brzina svjetlosti. Drugim rečima, ako bi se masa bilo koje supstance prijetvorila u energiju, bez ostatka, iznos energije koji će se dobiti dat je formulom (5). Na primer ako bi se u jednačinu uvrstio 1 kg uglja, za energiju se dobija 250 milijardi kilovat-časa, to je približno jednako energiji koju proizvedu sve elektrane u SAD za Mjesec dana. Kafena kašičica ugljene prašine bila bi dovoljna da najveći brod koji plovi okeanima nekoliko puta prijeđe rastojanje od Njujorka do Evrope i natrag. Iz svakodnevnog života svima je poznato da se prilikom sagorevanja uglja oslobađa neuporedivo manja količina energije. Da li to ukazuje na neispravnost STR ? Prilikom običnog sagorevanja uglja energija koja se oslobađa se energija koja nastaje kao rezultat hemijskog procesa, dolazi samo do prijeuređivanja i novog vezivanja atoma i molekula, ali ne dolazi do merljive konverzije mase u energiju jer se ugalj prijetvara u čađ, pepeo, dim, a ne nestaje. Kad bi se svi ovi krajnji produkti izmjerili njihova ukupna masa opet bi bila 1 kg. Upoređivanjem količine energije koja bi nastala pri prijetvaranju 1 kg uglja u energiju i običnog sagorevanja iste mase uglja, vidi se da se pri sagorevanju oslobađa tri milijarde puta manje energije. Naravno, proces u kome se znatna količina mase prijetvara u energiju je potpuno drugačije prirode od običnog sagorevanja.

4.7 VRIJEME U SPECIJALNOJ TEORIJI RELATIVNOSTI

Specijalna teorija relativnosti je podstakla mnogo drugačiji način razmišljanja o prostoru. Pokazala je da dužina, masa i energija nego tijela nisu stalne već da su ove veličine usko povezane sa brzinom. Ali, Ajnštajnova Teorija je pojam vremena uvela kao novu "dimenziju". Možda najveći doprinos STR bio je vezan za doprinos koji je dala drugačijem shvatanju pojma vremena.

Kako se prijem STR ponaša vrijeme može se videti na istom primeru koji je i do sada korišćen. Časovnici na raketama A i B pokazuju isto vrijeme u trenutku kada su rakete jedna pored druge, neka je, na primer, u tom trenutku bilo 12 časova. Ovo početno vrijeme može se nazvati nultim vremenom.



Kako vrijeme prolazi, rastojanje između A i B se povećava pošto se rakete kreću relativno jedna u odnosu na drugu, i posle nekog konačnog vremenskog intervala rastojanje između rakete A i rakete B iznosiće x . Ako posmatrač na A tada pogleda na svoj časovnik i uporedi sa časovnikom na B, biće iznenađen zato što ova dva časovnika ne pokazuju isto vrijeme – onaj koji se nalazi na B kasni. Ovu pojavu predviđa STR jer matematički rezultati pokazuju da se vrijeme koje pokazuju časovnici ponaša prijem jednačini :



$$t' = t \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

gdje je t' vrijeme koje posmatrač A "vidi" na časovniku B, a t vrijeme koje posmatrač A očitava na svom časovniku. Ako se prijetpostavi da je relativna brzina kojom se raketa A i B udaljavaju 150.000 km/s onda će posmatraču na raketi A izgledati da časovnik na B radi za približno 10% sporije, tj ako onaj na A pokazuje 1 čas, časovnik na B će pokazivati 54 minuta; uvijek kad posmatrač na A pogleda svoj časovnik, onaj na raketi B će pokazivati 9/10 tog vremena. Ako bi relativna brzina bila 260.000 km/s onda se prijem jednačini dobija da bi časovnik na B pokazivao samo polovinu vremena koje pokazuje časovnik A. Što je relativna brzina veća časovnik na raketi B će se kretati sve sporije i sporije, bez obzira da li se rakete približavaju ili udaljavaju. Naravno, i ako bi posmatrač koji putuje raketom B uporedio vrijeme na svom časovniku i onom u raketi A, dobio bi da časovnik u raketi A kasni, a to kašnjenje bi takođe bilo dato jednačinom (6).



Ovaj efekat kašnjenja časovnika u STR se naziva dilatacija vremena i ona nastaje onda kada se dva posmatrača kreću relativno jedan prijem drugom konstantnim brzinama, tada svakom od njih izgleda da časovnik onog drugog kasni. Iz ovih primera može se izvesti zaključak da razlog časovnici A i B kasne jedan u odnosu na drugi nije samo u specifičnom ponašanju svjetlosnih talasa već i uzrok toga i izvestan vremenski interval neophodan svjetlosnim talasima da putuju od jednog do drugog časovnika. Efekat dilatacije vremena odgovoran je za jedan potpuno drugačiji pogled na vrijeme od onog koji korišćen ranije. Ranije se uvijek smatralo da je vrijeme isto za sve posmatrača, ma gde se oni nalazili i ma kako se kretali, vrijeme je proticalo jednakom brzinom za svaku osobu i za svaki prijedmet u cijeloj vasioni. Vrijeme je bilo apsolutno. STR je pokazala da ovo shvatanje nije bilo tačno. Ona je pokazala da vrijeme protiče različitom brzinom za dva posmatrača koji se, jedan u odnosu na drugog, nalaze u relativnom kretanju.

Međutim, STR je pokazala da je vrijeme različito i za posmatrača koji jedan u odnosu na drugog miruju, ali koji se nalaze na velikoj udaljenosti jedan od drugog. Ako bi dva posmatrača, jedan koji se nalazi na Zemlji i drugi koji se nalazi u blizini zvijezde Aldebaran (u sazvežđu Taurus), posmatrali eksploziju supernove na zvijezdi Betelgeuse (u sazvežđu Orion). Rastojanje od Zemlje do zvijezde Betelgeuse iznosi 300 svjetlosnih godina, od Betelgeuse do Aldebarana je 250 svjetlosnih godina, a Aldebarana do Zemlje rastojanje je 53 svjetlosne godine. Neka se eksplozija supernove desi na primer 2000 godine (prije prema načinu kako mi merimo vrijeme na Zemlji). Ljudi na Zemlji ne bi videli blesak eksplozije te godine, jer je Betelgeuse udaljena 300 svjetlosnih godina, što znači da bi svjetlosnim talasima nastalim pri eksploziji bilo potrebno 300 godina da stignu do naše planete. To je jedini način da ljudi na Zemlji saznaju da je zvijezda uništena. S druge strane, neko u okolini Aldebarana bi istu eksploziju video 2250. godine, jer je Aldebara udaljen 250 svjetlosnih godina od Betelgeuse. Lako se uočava činjenica da ovaj događaj nije simultan (istovremen) za tri različita mesta, jer svako događaj posmatra u drugo vrijeme, čak se možda može reći da vrijeme putuje brzinom svjetlosti.



sa leve i desne strane, nalaze se i dve sijalice L i R. U trenutku kada rakete prolaze pored sijalice one se pale.

Kada posmatrač A prođe prijed sijalice L ona će se upaliti, u istom tom trenutku pali se i sijalica R pošto je pored nje prošla raketa B. Pošto je, po prijetpostavci, rastojanje od L do posmatrača C jednako rastojanju od R do C, vrijeme koje je potrebno da svjetlost sa upaljenih sijalica L i R stigne do C je jednako, pa će događaj paljenja ove dve sijalice za posmatrača C biti simultan (istovremen). Za posmatrača u raketama A i B situacija će biti malo drugačija. Rastojanje koje treba da prijeđe svjetlost sa sijalice L je daleko manje od rastojanja potrebno svjetlosti sa sijalice R da stigne do posmatrača A. Zbog razlike u dužini potrebnog vremena posmatrač A prvo će videti da se upalila sijalica L a tek kasnije će videti paljenje sijalice R. Posmatrač u raketi B će registrovati sličnu situaciju, sa tom razlikom što će njemu izgledati da se prvo upalila sijalica R a zatim L. Ova situacija pokazuje dva događaja koja su simultana za stacionarnog posmatrača, a nisu simultana za druga dva posmatrača. Ustvari, sa tačke gledišta posmatrača A, prvo se odigrao događaj L a zatim R, a sa tačke gledišta posmatrača B događaj R je prijetodio događaju L. Niko ne može reći koji se događaj "stvarno" odigrao prvi ili su se događaji možda odigrali istovremeno, jer su sva tri posmatrača jednako upravo i nijedan od ova tri pogleda nema prijednosti u odnosu na druge. STR je tako pokazala neispravnost vijekovima stare ideje o istovremenosti događaja, prije prema kojoj dva događaja, ako su istovremena za jednog posmatrača, moraju biti istovremena i za sve ostale posmatrača. Redosled događaja je funkcija položaja posmatrača i relativne brzine u odnosu na sve druge posmatrača. Istovremenost je relativna stvar, ne postoji apsolutno vrijeme.

Naravno treba naglasiti i to da što je veće rastojanje u prostoru između mesta odigravanja dva simultana događaja veća će biti moguća razlika u vremenu između ta dva događaja kako ih vide različiti posmatrači pod različitim uslovima. I obrnuto, ako se rastojanje između dva "istovremena" događaja smanji do iščezavanja, tj. ako se događaji dešavaju na istom mestu, svi posmatrači, bez obzira na njihove položaje i relativne brzine, složiću se u pogledu istovrijemnosti ovakva dva događaja. Na primer, ako bi došlo do sudara dve rakete, svi posmatrači će videti taj sudar kao jedan usamljen događaj. Bilo bi smešno, a i protivno svim zakonima fizike ako bi bilo koj posmatrač tvrdio da se jedna raketa sudarila prije druge bez fizičkog uzroka.

4.7.1 Paradoks Blizanaca

Predviđanja STR o dilataciji vremena navode na neke vrlo zanimljive, a možda i zastrašujuće ideje. Efekat dilatacije vremena mogao bi da ima neke vrlo interesantne primene za vasijska putovanja. STR ne samo da predviđa da će na raketi koja se kreće relativno brzinom bliskoj brzini svjetlosti samo vrijeme proticati sporije, ona takođe predviđa da će SVI procesi biti usporeni. To znači procesi varenja hrane, biološki procesi, atomska aktivnost – sve će biti usporeno !

Ako bi na primer neki "zvijezdani putnik" u dalekoj budućnosti odlučio da krene na "godišnji odmor" na primer do zvijezde Arcturus (sazvežđe Bootes, Pastir) koja je udaljena 33 svjetlosne godine. Ako bi putovao brzinom bliskom brzini svjetlosti on će na Arcturus stići za malo više od 33 godine, ali po vremenu na Zemlji, ako bi odmah krenuo natrag na Zemlju će stići približno 66 godina nakon odlaska. Kako se raketa cijelo vrijeme kretala ogromnom brzinom u odnosu na Zemlju svi procesi na raketi biće usporeni, putniku u raketi neće izgledati da je proteklo 33 godine za put u jednom smeru, on će stići u blizinu Arcturusa otprilike baš u vrijeme ručka, a kad se bude vratio na Zemlju izgledaće mu da je prošao samo jedan dan ! Ali, ljudima na Zemlji to će biti 66 godina, ljudi na Zemlji će biti 66 godina stariji. Jedan rezultat koji predviđa STR bio je izvor velike nedoumice i izvesnog neslaganja od vremena svog prijedstavljanja. To je tzv. paradoks blizanaca ili vremenski paradoks. Prijetpostavimo da od dva blizanca jedan odlazi na putovanje do neke daleke zvijezde i natrag a drugi ostaje na Zemlji. Neka je ta zvijezda udaljena 4 svjetlosne godine od Zemlje, a da se raketa kreće prosečnom brzinom koja je jednaka 4/5 brzine svjetlosti. Ukupno vrijeme za njeno putovanje biće tada oko 10 godina. Ako uporedimo brzinu proticanja vremena za blizanca u raketi sa brzinom proticanja vremena na Zemlji, na osnovu jednačine (6) dobija se :

$$t' = \frac{3}{5} t$$

Ovo znači da iako je putovanje trajalo deset godina prijema časovniku blizanca na Zemlji, prijema časovniku onog u raketi putovanje je trajalo samo šest godina. Po povratku sa puta blizanc će shvatiti da nije ostario onoliko koliko i njegov brat koji je stao na Zemlji. Paradoks se ovde ogleda u tome da pošto su sva kretanja relativna može da se smatra da je Zemlja otišla u svemirski prostor u pravcu suprotnom od rakete i vratila se dok je raketa mirovala. Na osnovu takvog razmatranja kretanja dolazi se do suprotnog zaključka – blizanc u raketi čekaće 10 godina na povratak svog brata, koji će misliti da je u putovanju (sa Zemljom) proveo samo šest godina. Očigledno je da ova dva tumačenja ne mogu istovremeno biti tačna. Upravo ova kontradikcija prijedstavlja tzv. paradoks blizanaca. Rešenje paradoksa je vrlo jednostavno, tačnije paradoks uopšte ne postoji pošto ove dve situacije nisu simetrične, pa nisu ni matematički reverzibilne. Razlog nepostojanja simetrije je taj što raketa na svom putovanju trpi određena ubrzanja, a prijetpostavka da Zemlja odlazi na putovanje nije ispravna jer bi u tom slučaju Zemlja morala da trpi odgovarajuća ubrzanja umesto rakete, a poznato je da se to ne dešava. STR neizbežno vodi do zaključka da će za vasijskog putnika na kružnom putovanju proći ukupno manje vremena, nezavisno od načina mjerenja, nego za ljude koji ostaju na Zemlji. Svaki putnik će se na Zemlju vratiti manje ostareo nego oni koji su

ostali da ga čekaju. Ukupan iznos usporenja vremena zavisice od brzine rakete u odnosu na Zemlju i ukupnog prijeđenog rastojanja za vrijeme puta.

Do fizičke osnove ovakvog zaključka može se doći poređenjem onoga što svaki blizanac vidi kad posmatra svjetlosne talase primljene iz niza događaja koji se dešavaju u sistemu onog drugog. Tokom prve polovine putovanja, zbog brzine kojom se raketa udaljava od Zemlje, svjetlosni talasi događaja na Zemlji stizaće do rakete sporijim tempom, učestalošću, nego kad bi raketa mirovala. Za brzinu rakete od $4/5$ brzine svjetlosti, ovo usporenje je dato formulom za tzv. relativistički Doplerov pomak, prijema kojoj će učestalost biti $1/3$ od normalne. Na sličan način za vrijeme povratka blizanac u raketi posmatra događaje na Zemlji kao da se odigravaju tri puta bržim tempom. Tokom cijelog putovanja blizanac na raketi registruje događaje na Zemlji kao da se odigravaju prosečnim tempom od $5/3$ (što je prosek za od jedne trećine i tri). Znači, rezultat je da blizanac na raketi zapaža da vrijeme na Zemlji protiče u proseku brže nego na raketi, pri čemu tačan odnos iznosi $5/3$, zbog toga će deset godina na Zemlji biti kao šest godina na raketi.

Situacija koju vidi blizanac na Zemlji je obrnuta. On svjetlosne talase događaja koji se na raketi odigravaju tokom prve polovine putovanja prima ukupno devet godina. To je zbog toga što raketi treba pet godina Zemaljskog vremena da stigne do zvijezde i još četiri godine su potrebne svjetlosnim talasima da stignu sa udaljene rakete do Zemlje, jer se raketa nalazi na rastojanju od četiri svjetlosne godine. Tokom ovih devet godina, blizanac na Zemlji posmatra događaje tri puta sporije od normalnog tempa, u skladu sa relativističkom formulom Doplerovog pomaka. Događaje koji se odigravaju na raketi tokom povratka na Zemlju blizanac sa Zemlje će posmatrati samo poslednje, desete godine. Za vrijeme ove poslednje godine on će događaje na raketi videti kao da se odigravaju tri puta brže nego što je to normalno. Ukupan rezultat daje da će događaje koji na raketi ukupno traju šest godina blizanac na Zemlji posmatrati deset godina, odnosno u proseku će vrijeme na raketi proticati sporije nego na Zemlji. Iz ovoga se vidi zbog čega fizička situacija nije simetrična za oba blizanca i zašto je ukupno vrijeme putovanja različito za svakog od njih. Blizanac sa rakete prijeusmerava svoju brzinu na polovini svog putovanja i počinje da zapaža događaje na Zemlji ubrzanim tempom odmah nakon toga, dok blizanac na Zemlji mora da čeka još četiri godine da svjetlosni talasi događaja okretanja rakete stignu do njega prije nego što počne da prima ubrzanim tempom događaje sa rakete. Jednostavnije rečeno, zemaljski blizanac prima svjetlosne talase događaja na raketi sporijim tempom ali duže vrijeme nego blizanac u raketi one sa Zemlje. Efekat ove asimetrije je da zemaljski blizanac posmatra manje događaja koji se dešavaju na raketi, nego što blizanac na raketi posmatra događaja na Zemlji za vrijeme cijelog putovanja.


Moglo bi izgledati da su zaključci koji proizilaze iz ovakvog putovanja u suprotnosti sa predviđanjem STR da je brzina svjetlosti maksimalna brzina. Kako je putovanje dugo osam svjetlosnih godina, a raketa ga prelazi za šest godina putovanja zabeleženim na raketi, prostim izračunavanjem brzine (deljenje prijeđenog puta sa utrošenim vremenom) dobija se da brzina kojom se raketa kretala za jednu trećinu veća od brzine svjetlosti. U čemu je ovde greška ? Razlog zbog čega se javlja "prijekoračenje" brzine svjetlosti je to što raketa stvari ne prelazi rastojanje od osam svjetlosnih godina. Kao posledica brzine rakete rastojanje do zvijezde biće skraćeno za blizanca u raketi usled Ficdžerald-Lorencove kontrakcije, pa na osnovu toga korišćenjem jednačine (1) i numeričkih vrednosti iz ovog primera dobija se skraćeno rastojanje od $4,8$ svjetlosnih godina za povratno putovanje. Deljenjem tog iznosa sa vremenom provedenim u putu, tj. sa šest godina, lako se utvrđuje da prosečna brzina stvarno iznosi $4/5$ brzine svjetlosti.

5. OPŠTA TEORIJA RELATIVNOSTI

STR pokazala se veoma uspešna u objašnjavanju okolnosti da brzina svetlosti izgleda ista svim posmatračima (kako je to pokazao Majklson-Morlijev eksperiment) i u opisivanju onoga što se događa kada se stvari kreću brzinama bliskim brzini svetlosti. Ona je, međutim, bila nesaglasna sa Njutnovom teorijom gravitacije koja je tvrdila da se tijela međusobno privlače silom koja zavisi od razdaljine među njima. Ovo je značilo da ako neko pomeri dalje jedno od tijela, sila kojom ono dejstvuje na drugo istog trenutka bi se smanjila. Ili, drugim rečima, gravitaciona dejstva trebalo bi da se kreću beskrajnom brzinom, umesto brzinom svetlosti ili ispod nje, kako je to zahtevala posebna teorija relativnosti. Ajnštajn je prijeduzeo više bezuspešnih pokušaja između 1908. i 1914. da dođe do teorije gravitacije koja bi bila saglasna sa teorijom relativnosti. Konačno, 1915, postavio je teoriju koju mi danas nazivamo Opšta teorija relativnosti (OTR).

5.1 PRINCIP EKVIVALENTNOSTI

U osnovi OTR leži jedno vrlo jednostavno, čak trivijalno zapažanje, to je tzv. princip ekvivalentnosti. Kada se neki putnik nalazi, u liftu ako lift krene naviše on ima osećaj kao da ga nešto dodatno pritiska prijema podu, ako nosi neki teret, teret postaje teži. Putniku se čini da su i on i teret otežali, a što je ubrzanje lifta teže će postajati teže.



I obrnuto, kad lift ubrzava naniže sve u njemu postaje lakše. U specijalnom slučaju, ako bi lift naniže ubrzavao ubrzanjem koje prijedmeti imaju kada slobodno padaju na Zemlju prijedmeti u liftu ne i uopšte imali težinu. Kada bi se lift ka Zemlji kretao sa još većim ubrzanjem, svaki prijedmet koji bi se u njemu našao bio bi pritisnut uz plafon lifta (treba napomenuti da se ovi efekti dešavaju samo kad lift ubrzava, usporava, kada se on kreće konstantnom brzinom ovi efekti se ne dešavaju). Zamislimo sada tog putnika u raketi koja polazi na međuzvezdano putovanje. On u raketi nema težinu, jer je težina sila kojom neko masivno telo (u našem slučaju Zemlja) privlači neki prijedmet, a raketa se nalazi van dometa privlačenja, tj. van gravitacionog polja. Da ne bi plutao po raketi putnik mora da bude vezan za svoje sedište. Dok raketa bude ubrzavala ka dalekoj zvijezdi, svi putnici u njoj biće pritisnuti na naslone sedišta, a kad raketa uspori biće gurnuti naprijed (isto kao i u automobilu na Zemlji). Tom logikom će putnici u raketi povezati pritisak unazad sa ubrzanjem, a udar unaprijed sa kočenjem. Kad se raketa bude kretala konstantnom brzinom ovi efekti se neće javljati. Dok raketa leti konstantnom brzinom kroz međuzvezdani prostor, prolazi pored jedne planete lualice. Niko iz rakete ne vidi ovu planetu i malo je nedostajalo da udari u raketu dok je prolazila iza njenog repa. U trenutku prolaska ove planete putnici opet dobijaju težinu. Oni će to osetiti tako što će biti povučeni prijema planeti dok ona prolazi, tj. ka naslonima njihovih sedišta. Kako niko u raketi ne zna za planetu koja prolazi iza njih, a efekat je isti kao kad je raketa ubrzavala, svi će pogrešno zaključiti da je raketa ubrzala, niko čak neće u to da sumnja.

Osnovno pitanje u vezi ovog misaonog eksperimenta je da li ljudi u raketi mogu (bez gledanja napolje) da znaju šta se zapravo desilo, da li sile koje osećaju potiču od ubrzanja ili od gravitacionog privlačenja. Odgovor je da ne postoji način da se utvrdi razlika između ove dve sile. Ajnštajn je bio impriješioniran ekvivalentnošću ubrzanja i gravitacione sile i iskazao je svoje zapažanje u obliku koji je danas poznat kao princip ekvivalencije i on glasi : u jednoj tački prostora efekti gravitacije i ubrzanog kretanja su ekvivalentni i ne mogu se međusobno razlikovati. Na osnovu principa ekvivalencije zaključuje se da je prividno povećanje težine putnika u liftu prouzrokovano ubrzavanjem lifta moguće izazvati i dodatnim gravitacionim silama. Ako bi se, na primer, lift sa putnicima prijebio na Jupiter, putnici bi osetili mnogo težim (masa Jupitera je 300 puta veća od mase Zemlje). Čovjek koji na Zemlji ima 100 kg, na Jupiteru imao masu od 250 kg (ustvari, masa se neće promeniti ali čovjek će na Jupiteru imati isti osećaj kao kada bi na Zemlji imao masu od 250 kg). Ne znajući za prijemeštanje lifta, putnici bi povećanje svoje težine pripisali ubrzanju lifta, ne znajući da je povećanje težine izazvano povećanom gravitacionom masom. Ako bi lift, pak, bio prijemešten na Merkur gde sve ima tri puta manju težinu, putnici bi mislili da je to posledica toga što lift ubrzava naniže.

Na izgled princip ekvivalentnosti je vrlo jednostavno zapažanje. Međutim , tek Ajnštajn je skrenuo pažnju na ovaj zaključak. Da iz tog zaključka ništa drugo nije proizašlo, bio bi ocenjen kao zanimljiv i odmah zatim zaboravljen. Uz ovaj princip ekvivalentnosti, kao osnovni postulat OTR, Ajnštajn je primenio jednu granu matematike, koju je prijetodno razvio Riman, tj. tenzorski račun i došao je do tri važna zaključka od kojih je svaki eksperimentalno provjeren.

5.2 AJNŠTAJNOVA TEORIJA GRAVITACIJE



Razvijajući OTR, Ajnštajn je radio na razvoju teorije gravitacije. Zato se OTR naziva i Ajnštajnova teorija gravitacije. Najbitnija stvar koju je uspela da odredi Ajnštajnova teorije gravitacije, a Njutnova teorija nije mogla, bila je tačna jednačina za putanje kojima planete putuju oko Sunca. Krajnji rezultat dobijen na osnovu OTR bio je približno isti kao kod Njutna ali ipak je postojala mala razlika. Ajnštajn je, kao i Njutn, našao da su putanje planeta elipse, ali utvrdio je da te elipse nisu stacionarne nego polako rotiraju u prostoru. Ova rotacija orbita koju je predvidela OTR je toliko mala da se za većinu planeta jedva može detektovati. Putanja Zemlje, na primer, rotira brzinom od samo 3,8 lučnih sekundi za 100 godina. Kako prav ugao ima 324.000 sekundi vidi se koliko je ta vrednost mala. Pored toga, treba da prođe 100 godina da bi se Zemljina orbita okrenula za taj iznos. Ovom brzinom trebalo bi 34 miliona godina za jedan pun obrt Zemljine orbite. Prijema ovoj teoriji orbite planeta su ustvari slične rozetama (ovako se ponašaju i elektroni oko jezgra). Kako je brzina ove rotacije mnogo mala, treba puno vremena da rozeta bude potpuna, pa se iz tih razloga uzima da su orbite planeta eliptične, a ne rozete. Ajnštajnova i Njutnova teorija gravitacije daju različite rezultate za iste pojave, pa prijema tome jedna od njih ne može da bude tačna. Razlika u vrednostima koje ove dve teorije daju je vrlo mala, pa bez obzira na to što je osnovi Njutnova teorija ne daje potpuno tačne rezultate, nju je moguće koristiti onda kada nije neophodna neka ogromna prijeciznost izračunavanja. Jedan dokaz OTR sastojao se u traganju za planetom čija orbita najviše rotira u datom vremenskom periodu. Teorija je pokazala da iznos rotacije treba da bude najveći za planete sa najvećom orbitalnom brzinom. Ali takođe je bilo potrebno da se koristi planeta čija je orbita što je moguće više eliptična, jer neke od orbita planeta, npr. Zemljina, su toliko bliske kružnim da je teško reći da li rotiraju ili ne.

Na veliku sreću desilo se da planeta Merkur ima jednu od najspljoštenijih orbita i najveću orbitalnu brzinu. Mnogo godina prije toga bilo je poznato zagonetno ponašanje orbite ove planete: imala je rotaciju od 43 lučne sekunde za 100 godina, koja se nije mogla objasniti (ukupna rotacija orbite Merkura je približno 574 lučnih sekundi za 100 god, bilo je poznato da 531 lučnu sec. treba pripisati gravitacionom efektu drugih planeta). Godine 1845. francuski matematičar Levjerije pokazao je da ovaj višak rotacije može da bude posledica postojanja još jedne lanete između Merkura i Sunca. Astronomi su uporno

tragali za tom planetom, ali ona nije nikad nađena (Levjerije je na isti način predvideo planetu Neptun iz varijacija u orbiti Urana i ona je bila uspešno otkrivena). I Pluton je bio otkriven 1930. god kao rezultat prijeostalih varijacija orbite Urana. Sve do objavljivanja OTR uzrok viška rotacije Merkura bio je misterija. Primenom OTR za izračunavanje viška rotacije u periodu od 100 godina dobijen je rezultat od 43 lučne sekunde, odnosno tačan iznos rotacije koji ranije nije mogao biti objašnjen. Bio je to prvi i najubedljiviji dokaz OTR.

5.3 ZNAČENJE ZAKRIVLJENOG PROSTOR-VREMENA

Ako se upoređuju samo brojni rezultati koje daju Njutnova i Ajnštajnova teorija gravitacije zaključuje se da se ove dve teorije vrlo malo razlikuju. Ali razlika u načinu na koji shvataju pojam gravitacije između ove dve teorije je ogromna. Za razliku od starinskih Njutnovih pojmova o gravitaciji kao sili, Ajnštajn je došao na revolucionarnu zamisao da gravitacija nije sila kao druge sile, već posledica činjenice da prostor vrijeme, nije ravan, protivno prijedhodnom opštem ubeđenju : ono je zakrivljeno, ili "savijeno", pod uticajem rasporeda mase i energije u njemu. Negde daleko u vasioni, daleko od bilo kojih izvora gravitacije, prostor i vrijeme su savršeno ravni. Ali sa približavanjem nekom masivnom objektu, kao što je zvijezda ili planeta ulazi se u prijedele sve veće zakrivljenosti prostor-vremena. Što je gravitaciono polje jače, tim je zakrivljenost prostor vremena naglašenija. Tijela poput Zemlje nisu bila sazdana da se kreću zakrivljenim orbitama pod dejstvom sile teže; umesto toga, ona se kreću gotovo pravom putanjom u zakrivljenom prostoru, a ta trajektorija naziva se geodezijska linija. Geodezijska linija je najkraća (ili najduža) putanja između dve tačke. Primera radi, površina Zemlje je 2-D zakrivljeni prostor. Geodezijska linija se u slučaju Zemlje naziva veliki krug i on prijedstavlja najkraći put između dve tačke. Budući da je geodezijska linija najkraća putanja između dva aerodroma, upravo je to put na koji će navigator uputiti pilota. U OTR, tijela se uvijek kreću pravolinijski u četvorodimenzionom prostor vremenu, ali nam svejedno izgleda da idu zakrivljenim putanjama u našem trodimenzionom prostoru. (Ovo nalikuje na posmatranje aviona koji prijeleće prijeko brdovitog prijedela. Iako on leti pravolinijski u trodimenzionom prostoru, njegova senka klizi zakrivljenom putanjom po dvodimenzionom tlu). Zapravo, glavna ideja koja je osnovi OTR je da materija saopštava prostor-vremenu kako da se zakrivi, a zakrivljeno prostor-vrijeme saopštava materiji kako da se ponaša. Intuitivno svi ljudi razumeju tri dimenzije prostora. To su jednostavno tri pravca : naprijed-nazad, levo-desno, gore-dole. Međutim, baš kao što lenjir meri rastojanje u pravcima prostora, sat na ruci meri rastojanja u vremenu. Do pojave STR rastojanje između dva različita položaja određivano je samo prijeravanjem rastojanja, pomoću merne trake ili nekog drugog pogodnog instrumenta. Vrijeme nikada nije ulazilo u mjerenja, jer se smatralo da je isto za dve različite pozicije. Međutim STR je pokazala da to nije tako, vrijeme je različito na dva različita položaja.



Zavisno od broja dimenzija "prostora" rastojanje između dve tačke se određuje na različite načine. U jednodimenzionalnom prostoru dužina OA je samo rastojanje duž x-ose i ovo mjerenje je trivijalno lako. Za 2D prostor dužina duži OA određuje se pomoću poznate Pitagorine teoreme :

$$OA = \sqrt{x^2 + y^2}$$


Kada je STR pokazala da u izraz za rastojanje mora da bude uračunato i vrijeme određivanje tačne jednačine više nije bilo lako. Matematika koja obuhvata sve poznate zakone za 2D koji čine geometriju i trigonometriju u ravni razvijana je u dugom vremenskom periodu. Ovi zakoni su postepeno proširivani na tri dimenzije, i oni se nalaze u granama matematike koje se zovu sferna trigonometrija i geometrija u prostoru. Međutim, ove grane matematike nisu se mogle nositi sa dodatnim faktorom vremena, tako da je morala biti razvijena jedna potpuno nova grana matematike, tzv. tenzorski račun, da bi se taj faktor uključio. Na taj način došlo se do formule za rastojanje u prostor-vremenu koja u svom konačnom obliku izgleda ovako :

$$OA = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + (ct)^2}$$

U jednačini c prijedstavlja brzinu svjetlosti, a t vrijeme. Kada je uočeno da je ovaj izraz sličan Pitagorinoj teoremi sa dodatkom faktora $(ct)^2$, sasvim je prirodan bio zaključak da se vrijeme ponaša kao da je četvrta dimenzija, i zbog toga se često govori o prostor-vremenu, ili prostornovremenskom kontinuumu. Osnovna ideja OTR je da gravitacija zakrivljuje četvorodimenzionalno prostor-vrijeme. Naravno, za vizuelno prijedstavljanje četvorodimenzionalnog prostor-vremena bila bi potrebna nadljudska sposobnost. Naučnici su zbog toga smislili neke "trikove" koji pojednostavljaju razumevanje delovanja gravitacije.

Zamislimo jednu zvijezdu sličnu Suncu. Ta zvijezda ima veliku masu i nju okružuje jako gravitaciono polje. Zamislimo sada da iz četvorodimenzionalnog prostor-vremena oko zvijezde isečemo i izvučemo jednu dvodimenzionalnu površ. Naravno, bez ikakvih teškoća možemo da zamislimo i shvatimo dvodimenzionalnu površ, tačno znamo šta znači da je neka površ ravna a šta znači da je ona zakrivljena. Posmatranjem ove površi (koja se tačno naziva hiperpovrš prostornog tipa) možemo da shvatimo kako gravitacija deluje na deo prostora zakrivljenog četvorodimenizionalnog prostor-vremena. Ovaj postupak uzimanja hiperpovrši prostornog tipa može se uporediti sa prijesecanjem kolača da bi se video raspored slojeva. Posmatranjem dijagrama na kome je prijedstavljena ova hiperpovrš (tzv. dijagrami uronjavanja) može se primetiti da je daleko od zvijezde prostor ravan a najveća zakrivljenost je neposredno iznad površine zvijezde gde je najjača gravitacija. Kad je Ajnštajn prvi put formulisao svoju teoriju, prijedložio je i eksperiment kojim bi se njegove zamisli mogle provjeriti. On je smatrao da će snop svjetlosti koji prolazi blizu Sunca biti skrenut sa svoje pravolinijske putanje jer je prostor kroz koji svjetlost prolazi zakrivljen. Zbog toga će likovi zvijezda biti neznatno pomjereni iz njihovih pravih pozicija. Da bi se provjerila ova prijetpostavka ustvari bilo je potrebno izmeriti težinu svjetlosnog snopa. Niko nije iznenađen činjenicom da Zemlja privlači metak ili strelu u letu. Oni imaju težinu. čak i u tetu, ali većina ljudi je iznenađena kad sazna da i svjetlosni snop ima težinu. Ovo međutim nije iznenađujuće za naučnike jer se smatra da fotoni, koji sačinjavaju svjetlost, imaju masu. Nije bilo moguće sakupiti hrpu fotona i staviti ih na vagu, kao što se može učiniti sa mecima, jer još niko nije uspeo da napravi klopku za hvatanje fotona (štaviše, danas se smatra da je masa fotona u stanju mirovanja jednaka nuli), pa se zbog toga fotoni moraju meriti dok su u letu. Ovo je vrlo jednostavno postići, ali teorijski – ako gravitaciono polje utiče na fotone, putanja svjetlosnog snopa će biti zakrivljena što je lako utvrditi ako je zakrivljenost dovoljno velika, ali ako gravitaciono polje ne utiče na fotone onda će putanja svjetlosnog snopa kroz polje biti prava linija, što se takođe lako detektuje.

Svi predmeti na Zemlji padnu oko 4,9 metara u prvoj sekundi slobodnog padanja (ako se zanemari otpor vazduha), pa se može očekivati da će i svjetlosni snop koji putuje paralelno sa površinom Zemlje takođe padati, tj. biti savijen ka površini Zemlje, za isti iznos tokom prve sekunde pada. Ali, svjetlosni snop putuje ogromnom brzinom tako da je praktično nemoguće otkriti ovaj efekat na Zemlji. Srećom, u Sunčevom sistemu postoji telo čije je gravitaciono privlačenje mnogo veće nego privlačenje Zemlje. To telo je Sunce. Gravitaciono privlačenje na površini Sunca je oko 27 puta veće nego na površini Zemlje, a oko 10 puta veće nego na površini Jupitera, zbog čega je Sunce najbolja "vaga" za mjerenje težine svjetlosnog snopa. Svjetlosni snop mora da dolazi sa neke udaljene zvijezde. Kada između Zemlje i zvijezde nema gravitacionih masa svjetlosni snop će se kretati pravolinijski. Ali prijetpostavimo sada da posle nekog vremena, krećući se oko Sunca, Zemlja dođe u takav položaj da sa njene površine izgleda kao da svjetlost sa zvijezde samo što ne dotiče površinu Sunca. Ovde se javlja veliki problem jer kad svjetlost zvijezde prolazi uz samu površinu Sunca, posmatrač neće biti u stanju da vidi zvijezdu jer je Sunčeva svjetlost suviše jaka. Jedino rešenje je da se posmatra svjetlost zvijezde za vrijeme totalnog pomračenja Sunca, kad Mjesec totalno prijekriva Sunčevu svjetlost. Zbog toga je Ajnštajn predložio da se ovaj efekat potraži za vrijeme totalnog pomračenja Sunca. Kako je skretanje svjetlosti sa zvijezde dok prolazi uz površinu Sunca tako neznatno, neophodne su precizne fotografske tehnike. Postupak se sastoji u tome da se zvijezda fotografiše u odnosu na ostale zvijezde kada nema Sunca a zatim se postupak ponovi za vrijeme totalnog pomračenja. Na toj novoj fotografiji videće se da je zvijezda malo "izmeštena" iz svog prvobitnog položaja. Ajnštajn je izračunao da bi ovakvo skretanje prividnog položaja zvijezde trebalo da iznosi 1,74 lučne sekunde. Najpovoljnije potpuno pomračenje Sunca nakon objavljivanja OTR 1916. godine, bilo je 29. Maja, 1919. godine. Ovo pomračenje je bilo posebno pogodno jer su Zemlja i Sunce krajem maja poravnati sa mnoštvom sjajnih zvijezda tako da je lako bilo izabrati neku od njih za posmatranje tokom ovog pomračenja. Za ovu priliku oprijemljene su dve britanske ekspedicije. Jedna, pod vođstvom A.C. Kromlina, otputovala je u Sobal u sjevernom Brazilu dok je druga, pod vođstvom A.S. Edingtona otišla na zapadnoafričko ostrvo Principe u Gvinejskom zalivu. Obe grupe su fotografisale veliki broj zvijezda i po povratku u Englesku razvijene su fotografske ploče i upoređene sa slikama napravljenim kada Sunce nije bilo u blizini istih zvijezda.



Grupa koja je bila u Sobralu našla je da su se njihove zvijezde pomerile u proseku za 1,98 lučnih sekundi, dok je na snimcima sa ostrva Principe nađeno pomeranje od 1,6 lučnih sekundi. Blisko slaganje ovih vrednosti sa onim što je Ajnštajn predvideo, bilo je dovoljno da potvrdi efekat. Tokom šest decenija, brižljivo ponavljanje ovog eksperimenta, kao i mnogih eksperimenata povezanih sa njim, nije ostavilo nikakve sumnje da je OTR daleko najpotpuniji, najtačniji, najelegantniji i najprecizniji opis gravitacije koji je čovječanstvo ikada imalo.

5.4 GRAVITACIJA I VRIJEME

OTR u osnovi ne pravi razliku između prostora i vremena, pri čemu shvatanju OTR i prostor i vrijeme su samo posebne dimenzije u četvorodimenzionalnom prostoru, tj. prostor-vremenu, koji analizira OTR. Pri čemu tome, lako je zaključiti da gravitacija ne utiče, ne zakrivljuje, samo prostorni deo ovog četvorodimenzionog prostor-vremena, nešto se mora dešavati i sa vremenskim delom. OTR predviđa da gravitacija usporava vrijeme. Daleko u prostoru, daleko od bilo kojih izvora gravitacije, gde je prostor-vrijeme savršeno ravno, časovnici otkucavaju normalnim tempom. Ali približavanjem nekom jakom izvoru gravitacije, ulazanjem u oblast sve veće gravitacione zakrivljenosti, časovnici će početi da kucaju sporije. Naravno, ako bi neki čovjek otišao na takvo

putovanje on tu pojavu neće opaziti jer i njegovo kucanje srca, njegov metabolizam, pa čak i misaoni procesi biti usporeni za isti faktor kao i rad njegovog časovnika. To usporavanje toka vremena moguće je otkriti samo u komunikaciji sa nekim ko je ostao daleko iza, tamo u savršeno ravnom prostor-vremenu, gde vrijeme protiče normalnom brzinom. Ovakvo razmišljanje navodi na zaključak da će na planeti manje mase vrijeme proticati brže nego na onoj sa velikom masom. Na Zemlji će časovnik raditi jednom brzinom, na Jupiteru nešto sporije a na Suncu još sporije. Ajnštajn je izračunao da bi jednoj sekundi na Suncu odgovaralo 1,000002 sekunde na Zemlji. Za mjerenje ovih neznatnih razlika, bukvalno shvaćeno, trebalo bi da se stavi časovnik na Sunce, sinhronizuje sa istim takvim časovnikom na Zemlji, i potom periodično upoređuju njihova pokazivanja. Sa navedenom razlikom u vremenu, časovnik na Suncu kasnio bi jednu sekundu za časovnikom na Zemlji nakon 500.000 sekundi, što je nešto manje od šest dana. Naravno, nemoguće je postaviti časovnik na Sunce, ali to i nije potrebno jer tamo već postoje mnogo atomski časovnici. U početku su vršeni mnogi eksperimenti i bilo je mnogo pokušaja da se registruje usporenje protoka vremena na Suncu u odnosu na Zemlju, ali svi pokušaji bili su bezuspešni. Prvi uspešan eksperiment koji je potvrdio ovaj efekat izvršen je 1960. godine, pet godina nakon Ajnštajnovе smrti, na Harvardskom univerzitetu. Eksperiment su izvršili dr Robert V. Paund i njegov asistent Glen A. Rebka. Ova dva naučnika su eksperimentu pristupila na potpuno drugačiji način. Oni su koristili toranj visok 22,6 metara. Časovnike su prijedstavljala jezgra radioaktivnog Co-57. Mjerenjem frekvencije fotona, tj. gama zraka, koji su nastajali prilikom radioaktivnog raspada ovog elementa uspjeli su da dokažu da gravitacija usporava vrijeme, "časovnik" koji se nalazio bliže Zemlji radio je sporije od onog na 22,6 metara visine. Ovim je definitivno potvrđena ispravnost Ajnštajnovе OTR.

6. OSNOVE KVANTNE TEORIJE


Uspeh naučnih teorija, a posebno Njutnove teorije gravitacije, naveo je francuskog naučnika, Markiza Laplasa, da početkom devetnaestog vijeka utvrdi da je Univjerzum potpuno deterministički. Laplas je smatrao da postoji skup naučnih zakona koji bi trebalo da nam omoguće da predvidimo sve što će se dogoditi u Univjerzumu, pod uslovom da znamo cijelokupno stanje Univjerzuma u datom vremenu. Primera radi, kada bismo znali položaje i brzine Sunca i planeta u nekom trenutku, tada bismo pomoću Njutnovih zakona mogli da izračunamo stanje Sunčevog sistema u bilo kom drugom vremenu. Determinizam izgleda prilično očigledan u ovom slučaju, ali Laplas je otišao i korak dalje, utvrdivši da postoje slični zakoni koji upravljaju svim ostalim oblastima, uključujući tu i ljudsko ponašanje.




Doktrini naučnog determinizma odlučno su se usprotivili mnogi autori koji su bili mišljenja da se ovim sputava sloboda Boga da utiče na svijet, ali ona je ipak formalno ostala na snazi u nauci sve do ranih godina XX vijeka. Jedan od prvih pokazatelja da će ovo uvjerenje morati da bude napušteno usledio je kada je iz proračuna britanskih naučnika lorda Rejlja i sera Džejmsa Džinsa proizašlo da neki topli objekat, ili telo, kakva je zvijezda, mora da zrači energiju u beskonačnom obimu. Saglasno zakonima u čiju se ispravnost vjerovalo u to vrijeme, jedno toplo telo trebalo je da odašilje elektromagnetne talase (kao što su radio-talasi, vidljiva svjetlost ili rendgenski talasi) ravnomerno na svim frekvencama. Primjera radi, toplo telo trebalo bi da zrači istu količinu energije na frekvencama između jedan i dva miliona talasa u sekundi, kao i na frekvencama između dva i tri miliona talasa u sekundi. Budući da je frekvenca talasa neograničena, to bi značilo da je ukupna energija zračenja beskonačna. Da bi izbegao ovaj očigledno besmislen ishod, nemački naučnik Maks Plank izložio je 14. decembra 1900. godine zamisao da svjetlost, rendgenski zraci i ostali talasi ne bivaju emitovani u proizvoljnom obimu, već samo u određenim paketima koje je on nazvao kvantima. Osim toga, svaki kvant ima određenu količinu energije koja je tim veća što je veća frekvenca talasa, tako da bi na dovoljno visokoj frekvenci emitovanje samo jednog kvanta zahtevalo više energije nego što je uopšte raspoloživo. Prijema tome, zračenje na visokim frekvencama bilo bi smanjeno, a i stopa kojom tijelo gubi energiju bila bi konačna.

Kvantna hipoteza sasvim je dobro objasnila izmjerenu količinu emitovanog zračenja toplih tijela, ali njen uticaj na determinističku doktrinu bio je shvaćen tek 1926. godine, kada je jedan drugi nemački naučnik, Vjerner Hajzenberg, formulisao svoje znamenito načelo neodređenosti. Da bi se predvidjeli budući položaj i brzina neke čestice, potrebno je tačno izmjeriti njen sadašnji položaj i brzinu. Očigledni način da se to učini jeste osvijetliti česticu. Čestica će reflektovati jedan dio talasa svjetlosti, što će ukazati na njen položaj. No, položaj čestice neće se moći tačnije odrediti nego što iznosi razmak između dva brijega svjetlosnog talasa, tako da je potrebno koristiti svjetlost kratkih talasnih dužina da bi se prijecizno odredio položaj čestice. Prijema Plankovoj kvantnoj hipotezi,

međutim, ne može se upotrebiti proizvoljno mala količina svjetlosti; treba uzeti bar jedan kvant. Ovaj kvant će poremetiti česticu i promijeniti njenu brzinu na način koji ne možemo predvidjeti. Štaviše, što tačnije merimo položaj, to treba koristiti kraće talasne dužine svjetlosti, pa je tako veća i energija jednog kvanta. A time će i brzina čestice biti u većoj meri poremećena. Drugim rečima, što tačnije pokušavate da izmerite položaj čestice, to manje prijecizno možete izmeriti njenu brzinu i obrnuto. Hajzenberg je pokazao da proizvod neodređenosti položaja čestice, neodređenosti brzine čestice i mase čestice ne može biti manji od određene veličine koja je poznata kao Plankova konstanta. Ovo ograničenje ne zavisi od načina na koji pokušavate da izmerite položaj ili brzinu čestice, kao ni od tipa čestice. Hajzenbergovo načelo neodređenosti prijedstavlja temeljno, neumitno svojstvo svijeta.



Načelo neodređenosti izvršilo je veoma važan uticaj na naš način viđenja svijeta. Čak ni sada mnogi filozofi još nisu postali svesni ovog uticaja, tako da je on i dalje predmet ozbiljnih kontrovjerzi. Načelo neodređenosti označilo je kraj sna o jednoj teoriji nauke,



o jednom modelu Univjerzuma koji bi bio potpuno deterministički : sasvim je izvesno da se ne mogu tačno predviđati budući događaji, ako se ne može prijecizno izmeriti čak ni trenutno stanje Univjerzuma ! Nov pogled na stvaran svijet omogućio je Hajzenbergu, Ervinu Šredingeru i Polu Diraku da tokom dvadesetih godina XX vijeka prijeformulišu mehaniku u jednu novu teoriju koja je dobila naziv kvantna mehanika i koja se temelji na načelu neodređenosti. U ovoj teoriji, čestice više nemaju zasebne i sasvim određene položaje i brzine koji se ne mogu posmatrati. Umesto toga, one imaju kvantno stanje koje prijedstavlja kombinaciju položaja i brzine. Ustvari, u kvantnoj teoriji čestice više nisu samo čestice, a talasi nisu samo talasi, kvantna teorija uvodi dualnu prirodu materije po kojoj se svakoj čestici pripisuje talas određene frekvence, a svakom talasu se pripisuje odgovarajuća korpuskularna struktura.

Uopšteno govoreći, kvantna mehanika ne predviđa jedinstven i određen rezultat nekog posmatranja. Naprotiv, ona predviđa veći broj različitih mogućih rezultata i govori nam o tome kakvi su izgledi svakog od njih. Drugim rečima, ukoliko se prijeduzme isto mjerenje

na velikom broju sličnih sistema, koji su svi započeli na isti način, ustanoviće se da će rezultat mjerenja biti A u izvesnom broju slučajeva, B u nekom drugom broju i tako dalje. Moguće je predvideti približan broj puta kada će rezultat biti A ili B, ali se ne može predvideti poseban rezultat nekog pojedinačnog mjerenja. Kvantna mehanika, dakle, uvodi neizbežan elemenat nepredvidljivosti ili nasumičnosti u nauku. Ajnštajn se ovome veoma protivio, uprkos važnoj ulozi koju je sam odigrao u razvoju ove zamisli. On je, naime, dobio Nobelovu nagradu upravo za doprinos postavljanju kvantne teorije. No, Ajnštajn nikada nije prihvatio ideju da Univerzumom vlada slučajnost; njegovo gledanje na ovu stvar sažeto je iskazano u znamenitoj rečenici: "Bog se ne igra kockicama !" Većina drugih naučnika, međutim, bila je sprijemna da prihvati kvantnu mehaniku zato što se ona savršeno slagala sa nalazima eksperimenata. I stvarno, bila je to izuzetno uspela teorija, koja stoji u temelju gotovo cijelokupne moderne nauke i tehnologije. Ona upravlja ponašanjem tranzistora i integrisanih kola, koji prijedstavljaju ključne delove elektronskih uređaja kao što su televizori i računari, a u osnovi je i moderne hemije i biologije. Jedina područja fizike u koja kvantna mehanika još nije prikladno uvedena jesu gravitacija i makrokosmičko uređenje Univerzuma.


7. NA GRANICI FIZIČKE REALNOSTI

Zašto je uopšte potrebna Opšta teorija relativnosti ? Zašto se mučiti složenim računima u četvorodimenzionalnom prostor-vremenu kada na i staromodna shvatanja Isaka Njutna ("gravitacija je sila") daju odličnu tačnost svakoj prilici. A matematika Njutnove gravitacije je mnogo jednostavnija od Ajnštajnovae. Čak i kad i za slanje ljudi na Mjesec, lansiranje svemirskih brodova ka planetama, stara Njutnova teorija izvanredno funkcioniše pri izračunavanju orbita i trajektorija.

Sve doskora, niko nije sigurno vjerovao da bi u Univjerzumu mogla da postoje mesta gde je prostor-vrijeme ozbiljno zakrivljeno. U blizini Sunca, oko zvijezda i galaksija, gravitacija je prilično slaba i prostor-vrijeme je neznatno zakrivljeno. Zato i staromodna njutnovska shvatanja funkcionišu tako dobro u mnogim prilikama. U slabim gravitacionim poljima, razumno je zameniti efekte zakrivljenog prostor-vremena efektima sile. Tokom 60-tih godina XX vijeka astronomi su najzad počeli da ozbiljnije naprijeđuju u razumevanju životnih ciklusa zvijezda. Oni su shvatili da se masivne zvijezde katastrofalno sažimaju pod nesavladivim uticajem gravitacije. Gravitacija oko neke takve masivne zvijezde, koja umire, nije više slaba. I zaista, zakrivljenost prostor-vremena postaje tako velika da zvijezda osuđena na porast nestaje iz naše vasiona, ostavljajući iza sebe rupu u kosmosu.

Zamislimo masivnu zvijezdu na kraju njenog života. Svo unutrašnje termonuklearno gorivo je potrošeno. Eksplozija supernove upravo je rastrgla zvijezdu, ali u njenom sagorelom jezgru ostalo je još mnogo mase, više od 2,5 solarnih masa. Nema te sile u prirodi koja može da zadrži takvu mrtvu zvijezdu: ona je osuđena da postane crna rupa. Prije početka gravitacionog kolapsa gravitacija na površini zvijezde je relativno slaba, prostor-vrijeme je još uvijek samo neznatno zakrivljeno. Do kolapsa dolazi naglo, čim gravitacija počne da savlađuje sile između čestica unutar sagorele zvijezde. U nekoliko sekundi zvijezda se strahovito skuplja dok njene čestice (protoni, elektroni, neutroni) bivaju zgnječeni jedni u druge. Dok gravitacija sabija zvijezdu na sve manju i manju zaprijetinu, zakrivljenost prostor vremena oko zvijezde postaje sve izraženija, a svjetlosni zraci koji napuštaju zvijezdu skreću pod sve većim uglovima.

Kako se zvijezda sve više približava svojoj neizbežnoj sudbini, sve više svjetlosnih zraka savija prijemom njenoj površini. Zakrivljenost prostor-vremena dalje raste, tako da još samo zraci koji skoro vjertikalno napuštaju zvijezdu uspevaju da odu. Kako se sve više i više svjetlosti vraća na zvijezdu, nekom udaljenom posmatraču izgleda da zvijezda postaje naglo gubi svoj sjaj.



Na kraju, u kritičnoj fazi kolapsa, zakrivljenost prostor-vremena postaje tako velika da svi zraci savijaju prijemom sve manjoj površini zvijezde. Zvijezda prijestaje da emituje bilo kakvu svjetlost u okolan prostor, postaje skroz crna. A kako se ništa ne može kretati brže od svjetlosti, ništa ne uspeva da pobegne sa zvijezde u spoljnu vasionu. Gravitacija je postala tako jaka da zvijezda bukvalno nestaje iz naše vasiona. Kada se kolapsirajuća zvijezda skupi do tog stepena da ništa, čak ni svjetlost, ne može da je napusti, kaže se da je zvijezda upala unutar svog horizonta događaja. Termin "horizont događaja" je veoma pogodan. To je doslovno horizont u geometriji prostora i vremena iza kojeg se ne može videti nijedan događaj. Ne postoji nikakav način da se sazna šta se dešava unutar

horizonta događaja. To je mesto koje je odvojeno od našeg prostora i vremena, to više nije deo naše vasionne. Na zvijezdinu nesreću, gravitacija nije zadovoljena time što je sabila zvijezdu unutar horizonta događaja. Kako i dalje nema nikakvih sila u prirodi koje i mogle da održe zvijezdu ona se dalje skuplja pod uticajem sve veće gravitacije. Jačina gravitacije i zakrivljenost prostor-vremena raste sve više dok na kraju čitava zvijezda ne bude sabijena u jednu tačku. U toj tački pritisak i gustina su beskonačni, i što je još važnije zakrivljenost prostor vremena je beskonačna. To je tačka u koju ide zvijezda. Svaki atom i svaka čestica zvijezde potpuno su smrvljeni i uništeni na tom mestu beskonačne zakrivljenosti prostora i vremena. To je samo srce crne rupe, koje se zove singularitet. Crne rupe su veoma jednostavne. One imaju samo dva dela: singularitet i horizont događaja koji ga okružuje. Crna rupa je prazna. Tu apsolutno nema ničega. Nema atoma, nikakvih stena, ni gasova ni prašine. Ničega ! Često se o horizontu događaja govori kao o površini crne rupe, na njemu nema ničega opipljivog. Sva zvijezdana materija je potpuno smrvljena i sabijena u singularitet u centru crne rupe. Sve što postoji u crnoj rupi je oblast beskonačno zakrivljenog prostora i vremena.

Mnogi čudni efekti OTR – isti oni koji su tako zanemarljivo mali ovde na Zemlji, ili u blizini Sunca, uvećani su prijeko svake mjere u blizini crne rupe. Usporavanje vremena, na primer, je na Zemlji potpuno zanemarljivo, ali na horizontu događaja koji okružuje crnu rupu vrijeme se potpuno zaustavlja. Unutar horizonta događaja pravci prostora i vremena su izmenjeni ! Ovde na Zemlji postoji sloboda kretanja kroz prostor, u bilo kom od tri pravca: gore-dole, levo-desno, naprijed-nazad. Ali, voleli mi to ili ne kroz vremenski pravac idemo samo u jednom smeru. Unutar crne rupe postoji sloboda kretanja kroz vrijeme, ali od toga nema nikakve koristi. Koliko se slobode dobije na kretanju kroz vrijeme, toliko se gubi u jednom od pravaca kretanja kroz prostor. Kroz prostor crne rupe moguće je ići samo u jednom smeru, a taj smer vodi pravo u singularitet. Crne rupe spadaju u najjednostavnije objekte u vasioni, ali to su najvjerojatnije i najčudniji objekti u našoj vasioni. Posmatranjem dijagrama uronjavanja, o kojima je već bilo reči, i primenom OTR može se doći do nekih vrlo egzotičnih svojstva crnih rupa.

Zamislimo jednu masivnu zvijezdu prijed kraj njenog života. Prijed početak kolapsa dijagram uronjavanja oko zvijezde izgleda kao prijetarana vjerzija dijagrama uronjavanja oko našeg Sunca. Sa naprijedovanjem kolapsa gravitacija unutar zvijezde postaje sve jača i jača. Zakrivljenost prostor-vrijeme postaje sve naglašenija, a deprijesija u dijagramu uronjavanja postaje sve dublja i dublja. Konačni oblik dijagrama uronjavanja koji prati stvaranje crne rupe, prvi su ispitali Ajnštajn i Rozen 30-tih godina ovog vijeka. Na njihovo iznenađenje našli su da se dijagram otvara i povezuje sa drugom vasionom ! Ovo neobično svojstvo crne rupe nazvano je Ajnštajn-Rozenov most. Ali to nije bilo sve. Kasnije se došlo do zaključka da je samo jedna od mogućnosti da most spaja našu vasionu sa nekom zasebnom oblašću prostor-vremena, koja je potpuno odvojena i nema nikakve veze sa našom vasionom. Ali jednako je bila prihvatljiva i zamisao da je to deo naše vasionne. Ovakvi "tuneli" između paralelnih vasiona ili između udaljenih delova jedne iste vasionne nazivaju se crvotočine. Treba napomenuti i to da crvotočine mogu da spajaju našu vasionu samu sa sobom na mnogo mesta, ali to bi bila različita mesta u prostor-vremenu. Drugim rečima, ulaskom u jednu od tih "drugih vasiona" mogli bismo ponovo ući u našu vasionu, na istom mestu, ali u nekom drugom vremenu. To je mašina za putovanje kroz vrijeme. Teorijski, kad bi smo zaronili u rotirajući crvotočinu i pažljivo pilotirali našim vasijskim brodom mogli bi smo se ponovo pojaviti u našoj vasioni prije milijardu godina i posetiti Zemlju prije nego što su se na njoj pojavili dinosauri. Da li je to zaista moguće ? Da li su neka od ovih fantastičnih predviđanja zaista istinita ? Na kraju krajeva sva ova predviđanja su direktna, logična posledica naše najbolje teorije gravitacije: opšte teorije relativnosti. Ipak, da li treba vjerovati u sve ovo ?


Tu ima nekoliko problema. Na primer, ako bi smo koristili crvotočinu kao vremensku mašinu i vratiti se u vrijeme prije milijardu godina, onda bi svakako mogli da se vratimo na Zemlju jedan sat prije nego što smo je napustili. Mogli bismo da sretnemo sami sebe i

ispričati samom sebi kako je putovanje bilo lepo i zanimljivo. Zatim bi smo obojica mogli ući u raketu i kruniti opet ! I opet ! I opet ! Očigledno, ovo bi bilo veoma čudno stanje stvari. Ipak, da bi smo prošli kroz crvotočinu trebali bi da se krećemo sasvim blizu beskonačno zakrivljenog prostor-vremena ne upadajući u njega. Šta znači stajati blizu singulariteta ? Kakvi se procesi dešavaju u blizini beskonačno zakrivljenog prostor-vremena ? Odgovore na ova pitanja ne znamo, ali teško da bi čovjek mogao da priježivi ono što se tamo dešava pa prijema tome od naših putovanja kroz crvotočine najvjerojatnije nema ništa.

Sedamdesetih godina XX vijeka Stiven Hoking, sa univerziteta u Kembridžu, je došao na ideju da na crne rupe "primeni" kvantnu teoriju, i to je dovelo do još čudnijih zaključaka. On je pokazao da crne rupe ustvari nisu tako crne.

Vratimo se Hajzenbergovom principu neodređenosti koji prijedstavlja osnovu kvantne teorije. Već je rečeno da postoji neodređenost između položaja i brzine, ali analogna neodređenost postoji između energije i vremena. Ne možemo saznati tačnu energiju sistema u svakom vremenskom trenutku. U kratkom vremenskom intervalu može postojati velika neizvesnost u pogledu količine energije u subatomsom svijetu. Jedan od najvažnijih zaključaka Ajnštajnovog STR je ekvivalentnost mase i energije. Kako jedna verzija principa neodređenosti objašnjava postojanje uzajamne neodređenosti između energije i vremena, princip se može izraziti i drugačije, kao uzajamna neodređenost između mase i energije u kvantnom svijetu. Dugim rečima, u veoma kratkom vremenskom intervalu ne možemo biti svesni koliko materije ima u nekom delu prostora. U kratkom trenutku treptaja prirode čestice i antičestice se mogu spontano pojaviti i nestati. Jedna od osnovnih ideja subatomske fizike glasi "Ako nešto nije strogo zabranjeno, onda će se to dogoditi". "Nešto" se ovde odnosi na bilo koji kvantni proces. Prijema tome, parovi svih mogućih čestica i antičestica stalno se stvaraju i uništavaju svuda, na svakom mestu u našoj vasioni. Naravno, nema načina za direktno posmatranje tih parova čestica i antičestica. To zabranjuje princip neodređenosti : parovi jednostavno postoje samo u kratkim vremenskim intervalima da je bilo kakvo posmatranje nemoguće. Zbog toga se oni nazivaju virtuelnim parovima.

Kako ovi virtuelni parovi nastaju svuda u vasioni, oni nastaju i u blizini horizonta događaja. Zamislmo sada jedan takav par koji se pojavljuje pored crne rupe. U jednom trenu čestica i antičestica se razdvajaju, ali jedna od tih dveju čestica biva "progutana", od strane crne rupe. Njen partner ostaje napušten, i zbog toga ova čestica ne može više da nestane. Napuštena čestica tako je prinuđena da postane realna čestica u realnom svijetu. Kad bi neko iz daljine posmatrao ovaj proces činilo bi mu se da je čestica izašla iz crne rupe. Tako bi dio doveden do apsolutno zapanjujućeg saznanja da crna rupa emituje čestice ! Hoking je došao do logičkog zaključka, ističući da energetski bilans prirode mora biti zadovoljen. Energija stvaranja ovih čestica mora doći odnegdje. Očigledan izvor energije je energija gravitacionog polja crne rupe. Kako crna rupa emituje čestice, ona mora da gubi energiju i zbog toga njena masa mora da se smanjuje, odnosno crne rupe isparavaju ! Dok materija curi iz crne rupe, vasionu ulazi nova informacija. Materija koju neka od rupa izbacuje ima boju, strukturu, hemijski sastav sve svježiji, novi podaci koji nisu ranije postojali u vasioni. Crna rupa je jedan "izvor informacija". Kvantni procesi koji leže u osnovi Hokingovog mehanizma isparavanja su potpuno slučajni. Zbog principa neodređenosti, ne može se predvidjeti gdje i kada će se pojaviti neka nova čestica. Zbog toga su i podaci koji se izbacuju u vasionu iz neke od crnih rupa sasvim slučajni. To je suština skoro formulisanog Hokingovog principa slučajnosti. Kao i Hajzenbergov princip neodređenosti i on je iskaz o osnovnim ograničenjima naše sposobnosti da spoznajemo realnost. Ako u vasioni ima




crnih rupa koje stvaraju nove čestice, onda podaci i informacije ulaze u vasionu na potpuno slučajan način.

Albert Ajnštajn nikada nije volio kvantnu mehaniku, mada je i sam dao veliki doprinos njenom razvoju. Iako je sve do sada rečeno u osnovi bilo o Ajnštajnovom geniju, u jednoj stvari on nije bio u pravu. Kvantna mehanika funkcioniše. U kvantnom svijetu postoji jedna neizvjesnost. Ali, s obzirom na Hokingova otkrića, možda postoji i neki nivo slučajnosti koji se proteže prijeko cijele vasionne. O tome govori i Hokingov "odgovor" Ajnštajnu : "Bog ne samo da se igra kockicama, nego ponekad baci kockice tamo gdje se one ne mogu vidjeti."

8. OBJEDINJENJE FIZIKE

Današnji naučnici opisuju Vaseljenu iz perspektive dve osnovne delimične teorije - opšte teorije relativnosti i kvantne mehanike. One prijedstavljaju ogromna intelektualna postignuća prve polovine XX vijeka. Opšta teorija relativnosti opisuje gravitacionu silu i makrokosmičko uređenje Univjerzuma - uređenje, naime, u rasponu od svega nekoliko kilometara do 1024 kilometara, koliko iznosi veličina vasiona dostupne posmatranjima. Kvantna mehanika, sa druge strane, usredsređena je na pojave izuzetno malih razmera, oko jednog milijarditog dela milimetra. Na žalost, poznato je da su ove dve teorije međusobno nesaglasne - one ne mogu obe biti ispravne. Jedan od glavnih zadataka savremene fizike jeste traganje za novom teorijom koja bi obuhvatila obe ove delimične teorije. To je takozvana kvantna teorija gravitacije. Ali još ne raspolažemo takvom teorijom i sva je prilika da je još daleko dan kada će se do nje konačno doći, ali zato su već poznata mnoga svojstva koja ona mora da poseduje.

Poslednjih dvadeset pet godina svog života Ajnštajn je proveo u traganju za Teorijom jedinstvenog polja, jednom teorijom koja bi opisala električna, magnetna i gravitaciona polja. On je 1953. godine, dve godine prije smrti, objavio rezultate svoje potrage za idealnom teorijom polja, dobijene do tog vremena. Vjerovao je da je uspeo da objedini fenomene gravitacije i elektromagnetizma u jedinstvenu teoriju. Na nesreću skup jednačina koje proizilaze iz njegove teorije daje beskonačan broj rešenja, a ne postoji način da se odredi koje rešenje je ispravno i važeće za našu vasionu. Da li je Ajnštajnova teorija jedinstvenog polja ispravna ili ne to još niko ne zna. S obzirom na okolnost da su



se delimične teorije kojima već raspolažemo pokazale dovoljne za dolaženje do tačnih predviđanja u svim okolnostima osim onih krajnjih, traganje za cjelovitom objedinjenom teorijom Univjerzuma teško da bi se moglo opravdati u praktičnom pogledu. (Trebalo bi, međutim, primetiti da se sličnim argumentima moglo pribeci i u slučaju relativnosti i kvantne mehanike, a ove teorije pružile su nam nuklearnu energiju i mikroelektronsku revoluciju !) Postavljanje cjelovite objedinjene teorije moglo bi, dakle, da ne doprinese opstanku naše vrste. Možda čak ne bi ni na koji način uticalo na način života. Ali još od osvita civilizacije ljudi se nisu zadovoljavali time da vide događaje kao nepovezane i neobjašnjive. Umesto toga, želeli su da proniknu u skriveni poredak svijeta. Najdublja želja čovječanstva za znanjem prijedstavlja dovoljno opravdanje za nastavak traganja. A cilj koji imamo prijed sobom nije ništa manje do potpuno opisivanje vasiona u kojoj živimo. Poznavanje vasiona daje užasnu moć. Razumjeti tajne atoma i galaksija znači postati sličan bogovima. Ljudi lete na Mjesec, "pale" zvijezdane vatre, a jednog dana će možda istraživati i crne rupe. Da li ćemo te sposobnosti koristiti za dobrobit čovječanstva ili za pustošenje naše planete, u potpunosti je stvar našeg slobodnog izbora. Zakoni prirode nisu zli, samo su naše namjere i motivacije ponekad zlonamjerne.

BIOGRAFIJA

UVOD

Albert Einstein je rođen 14. Marta, 1879. godine, a umro je 18. Aprila, 1955. godine. Bio je teoretski fizičar sa značajnim poznavanjem i primjenom matematičkih znanja. Često ga se smatra najvećim znanstvenikom 20-og stoljeća. Objavio je Teoriju relativnosti, a imao je značajan doprinos i u kvantnoj mehanici, statističkoj mehanici i kozmologiji. Godine, 1921. dobio je Nobelovu nagradu za objašnjenje fotoelektričnog učinka i za "doprinose teoretskoj fizici".

U općoj kulturi, Einstein je postao ikonom - sinonimom za osobu vrlo visoke inteligencije i općim genijalcem. Njegovo je lice poznato širom svijeta, a 1999. godine časopis *"Time"* ga je proglasio "Osobom stoljeća". U njegovu čast, jedinica u fotokemiji se zove einstein, a i jedan od kemijskih elemenata - einsteinium nosi njegovo ime.

MLADOST I FAKULTET

Einstein je rođen 1879. godine, u gradu Ulm, Wurttemberg, Njemačka. Einstein je pohađao Katoličku osnovnu školu, i na insistiranje svoje majke, pohađao je tečajeve violine. Kada je imao 5 godine, otac mu je pokazao kompas, a on je vrlo brzo zaključio da nešto u "praznom prostoru" djeluje na kompas. Premda su ga smatrali sporim učenikom i gotovo retardiranim osobom, Albert je rado sklapao različite uređaje i time se zabavljao. Njegova je opća sporost kasnije pripisana disleksiji. Kako je sam ponekada isticao, ta mu je sporost omogućila da dublje pronikne u svoju Teoriju relativnosti. Također, pričalo se da je Einstein pao matematiku kada je imao oko 12 godina, no to nije istina. Nakon što mu je otac poslovno propao, Einsteinovi se 1894. godine, sele u Paviju pokraj Milana. Albert je još neko vrijeme ostao u Muenchenu kako bi završio školovanje. Potom se i on doselio u Italiju. Godine, 1895. Albert polaže ispit na Švicarskom federalnom politehničkom Sveučilištu u Zurichu, ali pada na ispitu iz slobodnih umjetnosti. Godine, 1896. dobiva diplomu iz srednje škole. Godine, 1899. Albert upoznaje Milevu Marić, svoju školsku kolegicu koja je bila prijateljica Nikoli Tesli. Naravno, Albert se zaljubljuje. Godine, 1900. Einstein dobiva diplomu predavača na Eidgenoessische Technische Hochschule. Švicarsko državljanstvo dobiva 1901. Svoje ideje živo raspravlja s kolegama i sa Milevom. Godine, 1902. rađa im se kćer Liserl.

RAD I DOKTORAT

Nakon diplomiranja, Einstein nije mogao dobiti položaj predavača na Sveučilištu pa se 1902. godine, zapošljava kao istraživač u Švicarskom patentnom uredu. Tamo je Albert procjenjivao vrijednosti patenata, tj. njihovu originalnost i svojstva. Povremeno je i sam ispravljao sheme tih izuma kako bi ih poboljšao.

Einstein se oženio Milevom 06. Januara, 1903. godine. Einsteinov brak s Milevom je bio i intelektualno i romantično partnerstvo, Mileva je bila matematičarka. Einstein je čak za nju rekao : "Ona je stvorenje meni posve jednako - jako i nezavisno poput mene !". Godine, 1904. Albertu se rađa sin, Hans Albert Einstein. Godine, 1905. objavljuje svoj doktorat "O novom načinu određivanja molekularnih dimenzija". Iste godine piše 4 članka koji kasnije, kako se pokazalo, postaju temeljima moderne fizike. Fizičari se slažu da su tri od ta četiri članka zaslužila Nobelovu nagradu. Bili su to članci o Brownovom gibanju, fotoelektričnom efektu (učinku) i specijalnoj relativnosti. Pomalo je ironično da danas Einsteina svi vežu uz pojam relativnost, premda je Nobela dobio zbog objašnjenja fotoelektričnog efekta. Ta je godina, 1905. ostala zabilježena kao Posebna godina (Annus Mirabilis Papers), a godine, 2005. se slavi 100 godina od objave tih radova, pa je 2005. godine, proglašena Svjetskom godinom fizike.

SREDNJE GODINE

Godine, 1906. Einstein biva promoviran, a 1908. godine, odlazi raditi u Bern. Svojeg drugog sina, Eduarda, dobiva 28. Jula, 1910. Godine, 1912. po prvi put upotrebljava izraz "četvrta dimenzija" za vrijeme. Godine, 1919. se rastaje od Mileve i ženi se svojom nećakinjom Elsom (!). Nisu imali djece. Sudbina Einsteinove kćeri je nepoznata. Neposredno prije početka Prvog svjetskog rata, 1914., Einstein se seli u Berlin. Njegov pacifizam i židovsko porijeklo, iritirali su Nacističku Njemačku. Kasnije je postao svjetski poznatim, posebno nakon 07. Novembra, 1919. godine, kada je The Times objavio eksperimentalnu potvrdu njegove gravitacijske teorije. Nacisti kasnije pokreću kampanju u kojoj se napadaju njegove teorije i nastoji ga se diskreditirati.

• Opća Relativnost

Tokom Novembra, 1915. godine, Einstein je Pruskoj Akademiji znanosti predstavio svoju teoriju gravitacije, kasnije je ostala poznata pod nazivom Opća teorija relativnosti. U njoj Einstein iznosi ideju u zakrivljenosti prostor-vremena. .

• Kvantna Fizika

Premda je po svojim doprinosima kvantnoj fizici Einstein manje poznat, imao je zbilja blistavih trenutaka. Prvi je uveo pojam KVANT, čak i prije samog Plancka (Max Planck). Einsteinova ideja o kvantizaciji svjetlosti je bila toliko snažna, da je ucrtala put daljnjem razvoju kvantne mehanike. Ranih 20-ih godina prošlog stoljeća, Einstein je bio glavni osoba na tjednim kolokvijima Sveučilišta u Berlinu. Ostao je poznat i po dugim razgovorima koje je vodio s Nilsom Bohrom i po posebnom vidu pogleda na kvantnu fiziku - Kopenhaška interpretacija

• Bose-Einsteinova Statistika

Godine, 1924. Einstein dobiva pismo od mladog Indijskog fizičara Satyendra Nath Bose, a koji je svjetlost opisao kao fotonski plin. Bose ga traži za pomoć. Einstein je shvatio da se ta ideja može primijeniti i u statističkoj analizi atoma. Objavio je taj članak koji je bio vrlo nov i revolucionaran, utemeljena je nova grana statističke fizike, danas poznata kao Bose-Einsteinova statistika. Ta statistika opisuje ponašanje bozona. Einstein je pomogao i Erwinu Schrodingeru prilikom razvoja kvantne Boltzmanove distribucije...

KASNIJE GODINE

Dolaskom Hitlera na vlast u 1933. godini, mržnja prema Einsteinu postaje sve većom i on napušta Europu gdje je ostao do kraja života. Godine 1940. dobiva američko državljanstvo, zadržavajući pri tome i ono švicarsko. Posljednjih se godina svojeg života bavio pokušajima ujedinjenja gravitacije i elektromagnetizma, dajući pri tome i nove doprinose kvantnoj mehanici.

RELIGIOZNI POGLEDI

Premda je školovan u Katoličkoj osnovnoj školi, njegova su religiozna gledišta bila bliska filozofiji panteizma (Baruch Spinoza), smatrao je da Bog otkriva sebe u harmoniji svega što postoji, a ne u Osobi ili Biću koje upravlja životima pojedinca. Istaknuo je da od svih religija najviše preferira budizam !

POLITIČKI POGLEDI

Einstein je sebe smatrao pacifistom i humanitarcem. Einsteinovi pogledi na socijalizam i McCarthizam kao i rasizam su bili pomalo kontraverzni. Čak je i sam FBI smatrao da mu

treba zabraniti imigraciju u SAD. Mnogi Einsteinu zamjeraju i potporu koju je dao Americi ističući kako je dobro da su Amerikanci prvi izgradili atomsku bombu, bolje i oni nego Hitler. Nakon rata, Einstein je lobirao za nuklearno razoružanje i zagovarao je Svjetsku vladu. Također, Einstein je podržavao cionizam, a kasnije mu je čak bilo i ponuđeno da postane drugim predsjednikom Izraela što je ovaj odbio.

Lik Alberta Einsteina je i danas živ - ne samo u fizici, već i u političkim, ali i filozofskim pogledima.